

総合判定結果（コース別健診、市民健診）

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計								
異常なし	男	4,085	(9.5%)	97	1,045	863	686	468	509	370	47
	女	6,892	(15.2%)	142	1,209	1,424	1,515	925	1,183	453	41
	計	10,977	(12.4%)	239	2,254	2,287	2,201	1,393	1,692	823	88
放置可	男	3,609	(8.4%)	87	1,065	981	729	336	226	159	26
	女	5,637	(12.5%)	73	1,140	1,281	1,315	786	756	257	29
	計	9,246	(10.5%)	160	2,205	2,262	2,044	1,122	982	416	55
要経過観察	男	16,062	(37.3%)	165	1,697	3,088	3,992	2,907	2,324	1,509	380
	女	16,169	(35.7%)	63	1,170	2,209	3,769	3,180	3,439	1,871	468
	計	32,231	(36.5%)	228	2,867	5,297	7,761	6,087	5,763	3,380	848
要精密検査	男	6,487	(15.1%)	36	504	1,172	1,795	1,370	989	482	139
	女	5,634	(12.5%)	17	368	852	1,466	1,220	1,111	452	148
	計	12,121	(13.7%)	53	872	2,024	3,261	2,590	2,100	934	287
要治療	男	1,056	(2.5%)	0	43	153	309	233	191	95	32
	女	728	(1.6%)	1	12	43	132	154	222	131	33
	計	1,784	(2.0%)	1	55	196	441	387	413	226	65
治療中	男	11,737	(27.3%)	5	51	346	1,369	2,824	3,556	2,681	905
	女	10,173	(22.5%)	6	35	126	609	1,611	3,494	3,177	1,115
	計	21,910	(24.8%)	11	86	472	1,978	4,435	7,050	5,858	2,020
合計	男	43,036		390	4,405	6,603	8,880	8,138	7,795	5,296	1,529
	女	45,233		302	3,934	5,935	8,806	7,876	10,205	6,341	1,834
	計	88,269		692	8,339	12,538	17,686	16,014	18,000	11,637	3,363





ペプシノゲン検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ペプシノゲン	男	5,717	125	2	254	2	1	994	16	2	1,993	27	1	2,041	53	3	416	24	6	19	3	16
	女	2,597	104	4	18	1	6	453	14	3	1,196	31	3	730	43	6	186	14	8	14	1	7
	計	8,314	229	3	272	3	1	1,447	30	2	3,189	58	2	2,771	96	4	602	38	6	33	4	12

陽性率%

ヘリコバクター・ピロリ抗体検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	1,128	214	19.0	12	0	—	129	18	14	401	59	15	329	61	19	221	68	31	36	8	22
	女	1,315	269	20.5	19	3	16	148	21	14	473	77	16	415	95	23	228	63	28	32	10	31
	計	2,443	483	19.8	31	3	10	277	39	14	874	136	16	744	156	21	449	131	29	68	18	27

陽性率%

心電図検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	異常なし	男 20,792 (80.6%)	女 17,600 (87.8%)	計 38,392 (83.8%)	163	1,970	4,148	6,296	5,182	2,762
放置可	男 1,556 (6.0%)	女 864 (4.3%)	計 2,420 (5.3%)	20	184	304	402	376	233	37
要経過観察	男 2,639 (10.2%)	女 1,332 (6.6%)	計 3,971 (8.7%)	5	86	238	625	854	698	133
要精密検査	男 146 (0.6%)	女 52 (0.3%)	計 198 (0.4%)	3	8	14	32	46	37	6
要治療	男 13 (0.1%)	女 1 (0.0%)	計 14 (0.0%)	0	0	1	3	3	5	1
治療中	男 645 (2.5%)	女 192 (1.0%)	計 837 (1.8%)	1	2	10	73	221	265	73
合計	男 25,791	女 20,041	計 45,832	192	2,250	4,715	7,431	6,682	4,000	521

マスター負荷心電図所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	陽性ST-Tの変化 (ダブル)	男 1 (0.5%)	女 4 (4.8%)	計 5 (1.8%)	0	0	0	1	0	0
不整脈の出現 (ダブル)	男 9 (4.6%)	女 5 (6.0%)	計 14 (5.0%)	0	1	0	3	7	2	1
その他の負荷心電図所見	男 2 (1.0%)	女 0 (0.0%)	計 2 (0.7%)	0	1	0	0	1	0	0
検査者総数	男 195	女 84	計 279	0	37	6	36	71	32	13

自転車エルゴメータ負荷心電図所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	不整脈の出現	男 48 (7.8%)	女 8 (4.7%)	計 56 (7.1%)	0	2	10	9	18	6
ST-Tの変化	男 20 (3.2%)	女 9 (5.3%)	計 29 (3.7%)	0	1	2	6	9	1	1
血圧の変化	男 219 (35.6%)	女 20 (11.7%)	計 239 (30.4%)	0	7	36	75	79	16	6
検査者総数	男 616	女 171	計 787	0	38	183	211	143	28	13

安静心電図検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	洞性徐脈	男 421 (1.6%)	女 185 (0.9%)	計 606 (1.3%)	6	61	92	104	80	66
洞性頻脈	男 106 (0.4%)	女 82 (0.4%)	計 188 (0.4%)	0	7	10	35	33	18	3
洞性不整脈	男 38 (0.1%)	女 23 (0.1%)	計 61 (0.1%)	5	14	5	1	6	4	3
異所性上室調律	男 8 (0.0%)	女 12 (0.1%)	計 20 (0.0%)	1	0	2	2	0	1	2
移動性調律	男 1 (0.0%)	女 3 (0.0%)	計 4 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
右軸偏位 (100°以上)	男 37 (0.1%)	女 61 (0.3%)	計 98 (0.2%)	1	8	14	9	5	0	0
左軸偏位 (-30°以下)	男 211 (0.8%)	女 93 (0.5%)	計 304 (0.7%)	0	3	16	37	81	61	13
不定軸	男 7 (0.0%)	女 13 (0.1%)	計 20 (0.0%)	0	1	4	5	3	0	0
第一度房室ブロック	男 469 (1.8%)	女 133 (0.7%)	計 602 (1.3%)	0	15	41	82	132	161	38
第二度房室ブロック	男 5 (0.0%)	女 6 (0.0%)	計 11 (0.0%)	0	1	3	0	1	0	0
第三度房室ブロック	男 0 (0.0%)	女 1 (0.0%)	計 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
洞機能不全症候群疑い	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	計 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
WPW症候群	男 42 (0.2%)	女 14 (0.1%)	計 56 (0.1%)	0	5	9	12	10	6	0
PQ短縮	男 4 (0.0%)	女 5 (0.0%)	計 9 (0.0%)	1	0	1	2	0	0	0
不完全右脚ブロック	男 353 (1.4%)	女 127 (0.6%)	計 480 (1.0%)	3	40	65	94	84	59	8
完全右脚ブロック	男 510 (2.0%)	女 189 (0.9%)	計 699 (1.5%)	2	14	27	103	167	159	38
ヘミブロック	男 134 (0.5%)	女 64 (0.3%)	計 198 (0.4%)	0	8	16	19	48	34	9

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	完全左脚ブロック	男 13 (0.1%)	女 15 (0.1%)	計 28 (0.1%)	0	0	0	1	3	5
右室伝導遅延	男 379 (1.5%)	女 211 (1.1%)	計 590 (1.3%)	3	44	74	108	79	62	9
上室性期外収縮	男 179 (0.7%)	女 118 (0.6%)	計 297 (0.6%)	0	7	17	27	59	57	12
心室性期外収縮	男 306 (1.2%)	女 188 (0.9%)	計 494 (1.1%)	1	10	31	68	95	78	23
心房細動	男 137 (0.5%)	女 20 (0.1%)	計 157 (0.3%)	0	0	1	18	51	52	15
心房粗動	男 7 (0.0%)	女 1 (0.0%)	計 8 (0.0%)	0	0	0	0	4	3	0
左房負荷	男 1 (0.0%)	女 2 (0.0%)	計 3 (0.0%)	0	1	0	1	0	0	0
左房負荷疑い	男 78 (0.3%)	女 42 (0.2%)	計 120 (0.3%)	0	3	7	25	25	16	2
右房負荷	男 0 (0.0%)	女 2 (0.0%)	計 2 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
右房負荷疑い	男 14 (0.1%)	女 15 (0.1%)	計 29 (0.1%)	0	0	1	2	8	3	0
左室肥大	男 42 (0.2%)	女 11 (0.1%)	計 53 (0.1%)	2	0	4	6	13	13	4
左室肥大疑い	男 654 (2.5%)	女 138 (0.7%)	計 792 (1.7%)	1	11	62	151	222	176	31
右室肥大	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	計 1 (0.0%)	1	0	0	0	0	0	0
右室肥大疑い	男 37 (0.1%)	女 38 (0.2%)	計 75 (0.2%)	0	2	10	15	7	3	0
陈旧性心筋梗塞	男 28 (0.1%)	女 2 (0.0%)	計 30 (0.1%)	0	0	0	4	7	10	7
陈旧性心筋梗塞疑い	男 7 (0.0%)	女 1 (0.0%)	計 8 (0.0%)	0	0	0	0	3	4	0
心筋障害疑い	男 2 (0.0%)	女 0 (0.0%)	計 2 (0.0%)	0	0	0	2	0	0	0

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	ST低下	男 44 (0.2%)	女 56 (0.3%)	計 100 (0.2%)	0	1	1	7	13	16
ST-T異常	男 74 (0.3%)	女 30 (0.1%)	計 104 (0.2%)	0	1	6	20	17	24	6
異常Q波の疑い	男 192 (0.7%)	女 66 (0.3%)	計 258 (0.6%)	0	5	10	48	74	45	10
r波増高不良	男 13 (0.1%)	女 17 (0.1%)	計 30 (0.1%)	0	2	2	2	5	1	1
陰性T波	男 221 (0.9%)	女 264 (1.3%)	計 485 (1.1%)	1	2	18	44	81	63	12
T波平低化	男 94 (0.4%)	女 129 (0.6%)	計 223 (0.5%)	0	1	7	16	34	30	6
T波増高	男 219 (0.8%)	女 4 (0.0%)	計 223 (0.5%)	4	40	50	53	42	25	5
ST上昇	男 201 (0.8%)	女 15 (0.1%)	計 216 (0.5%)	0	11	22	58	53	51	6
早期再分極症候群	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	計 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
QT延長	男 80 (0.3%)	女 114 (0.6%)	計 194 (0.4%)	3	2	4	19	27	21	4
QT短縮	男 1 (0.0%)	女 2 (0.0%)	計 3 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
Brunswick症候群の疑い	男 7 (0.0%)	女 0 (0.0%)	計 7 (0.0%)	0	0	0	1	4	2	0
低電位差	男 4 (0.0%)	女 12 (0.1%)	計 16 (0.0%)	0	0	0	1	1	1	1
右胸心	男 4 (0.0%)	女 1 (0.0%)	計 5 (0.0%)	0	0	0	1	1	2	0
ペースメーカー調律	男 15 (0.1%)	女 2 (0.0%)	計 17 (0.0%)	0	1	0	1	6	4	3
その他の所見	男 298 (1.2%)	女 108 (0.5%)	計 406 (0.9%)	5	2	2	44	89	130	26
検査者総数	男 25,874	女 20,041	計 45,915	193	2,289	4,758	7,431	6,682	4,000	521





眼底写真判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
異常なし	男	5,412 (62.9%)	1	72	1,196	2,062	1,634	427	20
	女	3,852 (73.5%)	0	31	860	1,564	1,120	262	15
	計	9,264 (66.9%)	1	103	2,056	3,626	2,754	689	35
放置可	男	360 (4.2%)	0	0	10	88	170	77	15
	女	243 (4.6%)	0	0	7	48	119	59	10
	計	603 (4.4%)	0	0	17	136	289	136	25
要経過観察	男	2,175 (25.3%)	0	1	46	348	995	679	106
	女	788 (15.0%)	0	1	10	115	299	298	65
	計	2,963 (21.4%)	0	2	56	463	1,294	977	171
要精密検査	男	371 (4.3%)	0	0	9	70	146	120	26
	女	197 (3.8%)	0	0	12	30	60	70	25
	計	568 (4.1%)	0	0	21	100	206	190	51
要治療	男	8 (0.1%)	0	0	0	2	3	2	1
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	1
	計	10 (0.1%)	0	0	0	3	3	2	2
治療中	男	273 (3.2%)	0	1	4	37	112	94	25
	女	162 (3.1%)	0	0	1	18	53	60	30
	計	435 (3.1%)	0	1	5	55	165	154	55
合計	男	8,599	1	74	1,265	2,607	3,060	1,399	193
	女	5,244	0	32	890	1,776	1,651	749	146
	計	13,843	1	106	2,155	4,383	4,711	2,148	339

眼底検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		男	女	計	男	女	計	男	女	計
細動脈狭細化	男	189 (2.2%)	0	0	1	30	94	51	13	白内障の疑い	男	454 (5.3%)	0	0	2	16	144	220	72
	女	48 (0.9%)	0	0	0	8	22	10	8		女	266 (5.1%)	0	0	1	12	60	129	64
	計	237 (1.7%)	0	0	1	38	116	61	21		計	720 (5.2%)	0	0	3	28	204	349	136
細動脈口径不同	男	97 (1.1%)	0	0	2	22	43	28	2	視神経乳頭異常	男	8 (0.1%)	0	0	0	3	3	2	0
	女	31 (0.6%)	0	0	1	5	14	8	3		女	4 (0.1%)	0	0	0	2	2	0	0
	計	128 (0.9%)	0	0	3	27	57	36	5		計	12 (0.1%)	0	0	0	5	5	2	0
眼底出血	男	35 (0.4%)	0	0	1	6	19	6	3	視神経乳頭異常の疑い	男	274 (3.2%)	0	1	11	61	120	68	13
	女	18 (0.3%)	0	0	1	5	6	3	3		女	127 (2.4%)	0	1	3	28	54	29	12
	計	53 (0.4%)	0	0	2	11	25	9	6		計	401 (2.9%)	0	2	14	89	174	97	25
細動脈反射増強	男	755 (8.8%)	0	0	5	122	350	240	38	光凝固後	男	33 (0.4%)	0	0	1	5	14	10	3
	女	362 (6.9%)	0	0	2	47	145	143	25		女	9 (0.2%)	0	0	0	3	1	3	2
	計	1,117 (8.1%)	0	0	7	169	495	383	63		計	42 (0.3%)	0	0	1	8	15	13	5
動静脈交叉現象	男	1,151 (13.4%)	0	0	18	193	584	324	32	網膜有髄神経線維の疑い	男	52 (0.6%)	0	0	2	13	19	18	0
	女	394 (7.5%)	0	0	5	66	160	142	21		女	13 (0.2%)	0	0	0	4	5	3	1
	計	1,545 (11.1%)	0	0	23	259	744	466	53		計	65 (0.5%)	0	0	2	17	24	21	1
毛細血管瘤(赤色点)	男	4 (0.0%)	0	0	0	1	1	2	0	網膜静脈瘻疾風の疑い	男	42 (0.5%)	0	0	6	15	13	7	1
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0		女	22 (0.4%)	0	0	2	11	7	0	2
	計	6 (0.0%)	0	0	0	2	2	2	0		計	64 (0.5%)	0	0	8	26	20	7	3
新生血管	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0	瞳孔の閉鎖不十分	男	137 (1.6%)	0	0	3	18	51	53	12
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	38 (0.7%)	0	0	2	5	11	17	3
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0		計	175 (1.3%)	0	0	5	23	62	70	15
静脈拡張	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0	黄斑部異常の疑い	男	202 (2.3%)	0	0	4	38	87	67	6
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	70 (1.3%)	0	0	2	11	21	29	7
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0		計	272 (2.0%)	0	0	6	49	108	96	13
点状出血	男	73 (0.8%)	0	0	1	12	39	20	1	右眼のみ撮影	男	21 (0.2%)	0	0	0	3	7	8	3
	女	9 (0.2%)	0	0	0	0	5	4	0		女	5 (0.1%)	0	0	0	2	2	1	0
	計	82 (0.6%)	0	0	1	12	44	24	1		計	26 (0.2%)	0	0	0	5	9	9	3
斑状出血	男	51 (0.6%)	0	0	0	10	28	12	1	左眼のみ撮影	男	14 (0.2%)	0	0	0	4	5	4	1
	女	9 (0.2%)	0	0	0	1	5	2	1		女	8 (0.2%)	0	0	0	0	1	7	0
	計	60 (0.4%)	0	0	0	11	33	14	2		計	22 (0.2%)	0	0	0	4	6	11	1
網膜白斑	男	418 (4.8%)	0	0	3	44	189	155	27	その他の所見	男	317 (3.7%)	0	1	15	71	132	85	13
	女	153 (2.9%)	0	0	2	11	58	65	17		女	178 (3.4%)	0	0	12	33	60	54	19
	計	571 (4.1%)	0	0	5	55	247	220	44		計	495 (3.6%)	0	1	27	104	192	139	32
網膜浮腫	男	3 (0.0%)	0	0	0	1	2	0	0	検診者総数	男	8,620	2	82	1,267	2,612	3,063	1,401	193
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0		女	5,247	0	32	890	1,779	1,651	749	146
	計	3 (0.0%)	0	0	0	1	2	0	0		計	13,867	2	114	2,157	4,391	4,714	2,150	339

肺機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男	5,284 (93.3%)	46	376	965	1,543	1,555	662
女		2,804 (95.4%)	21	77	482	898	775	455	96
計		8,088 (94.0%)	67	453	1,447	2,441	2,330	1,117	233
放置可	男	307 (5.4%)	1	9	20	83	87	78	29
	女	114 (3.9%)	0	1	8	29	33	34	9
	計	421 (4.9%)	1	10	28	112	120	112	38
要経過観察	男	52 (0.9%)	0	0	3	8	12	18	11
	女	12 (0.4%)	0	0	1	3	2	5	1
	計	64 (0.7%)	0	0	4	11	14	23	12
要精密検査	男	17 (0.3%)	0	0	1	1	8	6	1
	女	7 (0.2%)	0	0	2	2	1	1	1
	計	24 (0.3%)	0	0	3	3	9	7	2
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	2 (0.1%)	0	0	0	1	0	1	0
	計	3 (0.0%)	0	0	0	2	0	1	0
合計	男	5,661	47	385	989	1,636	1,662	764	178
	女	2,939	21	78	493	933	811	496	107
	計	8,600	68	463	1,482	2,569	2,473	1,260	285

肺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	%肺活量 %	男	5,638	103.6	447	102.4	990	106.3	1,618	105.9	1,647	103.2	757	98.3	179
女		2,907	102.7	99	99.0	489	101.9	913	105.1	806	103.0	493	100.2	107	98.8
計		8,545	103.3	546	101.8	1,479	104.9	2,531	105.6	2,453	103.2	1,250	99.1	286	96.4
一秒率 %	男	5,638	81.0	447	85.3	990	82.8	1,618	81.2	1,647	80.0	757	78.9	179	77.3
	女	2,907	82.1	99	86.9	489	85.1	913	82.2	806	81.2	493	80.1	107	79.3
	計	8,545	81.4	546	85.6	1,479	83.6	2,531	81.5	2,453	80.4	1,250	79.4	286	78.0





血圧判定結果

判定	総数		19歳以下		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
異常なし	男	19,442	(63.7%)	258	3,748	5,136	5,286	3,330	1,492	192						
	女	19,637	(80.6%)	193	3,563	4,703	5,764	3,863	1,377	174						
	計	39,079	(71.2%)	451	7,311	9,839	11,050	7,193	2,869	366						
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0						
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0						
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0						
要経過観察	男	6,200	(20.3%)	23	549	1,004	1,721	1,752	1,045	106						
	女	2,504	(10.3%)	1	83	208	648	873	606	85						
	計	8,704	(15.9%)	24	632	1,212	2,369	2,625	1,651	191						
要精密検査	男	564	(1.8%)	0	9	52	158	208	124	13						
	女	226	(0.9%)	0	0	23	62	82	51	8						
	計	790	(1.4%)	0	9	75	220	290	175	21						
要治療	男	143	(0.5%)	0	2	20	52	43	22	4						
	女	45	(0.2%)	0	0	1	20	17	5	2						
	計	188	(0.3%)	0	2	21	72	60	27	6						
治療中	男	4,179	(13.7%)	0	6	130	632	1,632	1,535	244						
	女	1,942	(8.0%)	0	1	31	245	772	697	196						
	計	6,121	(11.2%)	0	7	161	877	2,404	2,232	440						
合計	男	30,528		281	4,314	6,342	7,849	6,965	4,218	559						
	女	24,354		194	3,647	4,966	6,739	5,607	2,736	465						
	計	54,882		475	7,961	11,308	14,588	12,572	6,954	1,024						

血圧（安静時・負荷時）の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
安静時血圧・最大 mmHg	男	31,155	123.3	4,806	119.3	6,452	119.5	7,995	121.9	7,066	126.3	4,275	129.9	561	130.3
	女	24,493	114.0	3,884	107.0	5,009	107.8	6,777	112.9	5,620	118.9	2,738	125.7	465	128.4
	計	55,648	119.2	8,690	113.8	11,461	114.4	14,772	117.8	12,686	123.0	7,013	128.2	1,026	129.4
安静時血圧・最小 mmHg	男	31,155	76.3	4,806	68.7	6,452	73.3	7,995	77.6	7,066	80.6	4,275	80.2	561	75.9
	女	24,493	69.9	3,884	64.9	5,009	66.7	6,777	70.1	5,620	73.4	2,738	74.7	465	72.9
	計	55,648	73.5	8,690	67.0	11,461	70.4	14,772	74.2	12,686	77.4	7,013	78.1	1,026	74.5
負荷後血圧・最大 mmHg	男	195	139.3	37	132.5	6	134.0	36	144.1	71	137.9	32	143.6	13	145.1
	女	84	128.8	3	119.3	3	122.0	24	122.6	38	129.0	13	140.9	3	139.3
	計	279	136.1	40	131.5	9	130.0	60	135.5	109	134.8	45	142.8	16	144.0
負荷後血圧・最小 mmHg	男	195	77.9	37	71.8	6	75.7	36	80.5	71	80.4	32	78.7	13	73.4
	女	84	72.7	3	71.3	3	72.0	24	68.8	38	72.6	13	80.3	3	73.3
	計	279	76.3	40	71.8	9	74.4	60	75.8	109	77.7	45	79.2	16	73.4

眼圧の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
眼圧・右 mmHg	男	3,689	13.9	6	14.0	777	14.1	1,107	14.1	1,275	13.8	473	13.8	51	13.3
	女	2,801	13.7	7	11.4	521	13.8	1,028	13.8	988	13.7	237	13.6	20	13.8
	計	6,490	13.9	13	12.6	1,298	14.0	2,135	13.9	2,263	13.8	710	13.7	71	13.4
眼圧・左 mmHg	男	3,680	14.1	6	14.3	777	14.3	1,107	14.3	1,272	14.0	467	14.1	51	13.7
	女	2,800	14.0	7	12.0	521	13.8	1,028	14.1	986	14.0	238	13.8	20	14.1
	計	6,480	14.1	13	13.1	1,298	14.1	2,135	14.2	2,258	14.0	705	14.0	71	13.8

内科診察判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	21,795 (98.0%)	138	1,574	3,502	6,818	6,075	3,302	386
	女	15,531 (96.6%)	69	988	2,458	5,343	4,431	1,994	248
	計	37,326 (97.4%)	207	2,562	5,960	12,161	10,506	5,296	634
放置可	男	182 (0.8%)	0	6	29	46	47	48	6
	女	132 (0.8%)	0	5	9	29	52	29	8
	計	314 (0.8%)	0	11	38	75	99	77	14
要経過観察	男	170 (0.8%)	0	4	32	40	45	45	4
	女	333 (2.1%)	1	5	39	120	101	55	12
	計	503 (1.3%)	1	9	71	160	146	100	16
要精密検査	男	27 (0.1%)	0	0	1	8	12	6	0
	女	26 (0.2%)	0	0	4	6	11	4	1
	計	53 (0.1%)	0	0	5	14	23	10	1
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
治療中	男	61 (0.3%)	1	1	1	9	18	26	5
	女	46 (0.3%)	0	0	7	15	12	9	3
	計	107 (0.3%)	1	1	8	24	30	35	8
合計	男	22,235	139	1,585	3,565	6,921	6,197	3,427	401
	女	16,070	70	998	2,517	5,513	4,609	2,091	272
	計	38,305	209	2,583	6,082	12,434	10,806	5,518	673

内科診察所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
眼瞼結膜貧血あり	男	4 (0.0%)	1	1	0	2	0	0	0
	女	30 (0.2%)	1	1	5	19	3	1	0
	計	34 (0.1%)	2	2	5	21	3	1	0
扁桃腺肥大	男	52 (0.2%)	0	7	27	13	4	1	0
	女	27 (0.2%)	0	5	5	5	10	2	0
	計	79 (0.2%)	0	12	32	18	14	3	0
頸部リンパ節腫脹	男	4 (0.0%)	0	0	2	0	1	1	0
	女	7 (0.0%)	0	0	1	3	2	1	0
	計	11 (0.0%)	0	0	3	3	3	2	0
甲状腺腫大	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
	女	98 (0.6%)	0	3	18	35	35	6	1
	計	100 (0.3%)	0	3	18	35	37	6	1
心拍不整	男	83 (0.4%)	0	1	4	12	28	33	5
	女	30 (0.2%)	0	1	1	5	13	8	2
	計	113 (0.3%)	0	2	5	17	41	41	7
収縮期雑音	男	38 (0.2%)	0	0	4	7	13	14	0
	女	32 (0.2%)	0	0	3	5	12	8	4
	計	70 (0.2%)	0	0	7	12	25	22	4
拡張期雑音	男	6 (0.0%)	0	0	2	2	1	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	7 (0.0%)	0	0	2	3	1	1	0
連続性雑音	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
3音、4音	男	2 (0.0%)	0	0	1	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	1	0	1	0	0
乾性ラ音	男	23 (0.1%)	0	0	5	4	9	4	1
	女	10 (0.1%)	0	0	1	3	4	0	2
	計	33 (0.1%)	0	0	6	7	13	4	3
湿性ラ音	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
呼吸音の減弱	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	2 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	1
肝触知	男	2 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	3 (0.0%)	0	0	0	1	0	2	0
腹部圧痛	男	51 (0.2%)	0	1	8	18	15	8	1
	女	129 (0.8%)	0	0	16	47	40	20	6
	計	180 (0.5%)	0	1	24	65	55	28	7
腹部腫痛触知	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	27 (0.2%)	0	0	4	14	7	2	0
	計	29 (0.1%)	0	0	4	14	8	3	0
下肢静脈痛	男	9 (0.0%)	0	0	0	1	3	5	0
	女	34 (0.2%)	0	0	0	6	10	15	3
	計	43 (0.1%)	0	0	0	7	13	20	3
関節変形	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	9 (0.1%)	0	0	0	1	3	4	1
	計	10 (0.0%)	0	0	0	1	4	4	1
関節腫脹	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
浮腫	男	17 (0.1%)	0	0	1	5	6	5	0
	女	18 (0.1%)	0	0	0	6	7	4	1
	計	35 (0.1%)	0	0	1	11	13	9	1
黄色腫	男	5 (0.0%)	0	0	0	1	3	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	6 (0.0%)	0	0	0	1	4	1	0
術創あり	男	138 (0.6%)	0	1	10	35	40	46	6
	女	101 (0.6%)	0	0	5	23	39	28	6
	計	239 (0.6%)	0	1	15	58	79	74	12
皮膚の異常	男	4 (0.0%)	0	0	2	1	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	4 (0.0%)	0	0	2	1	0	1	0
皮膚の乾燥・掻じわ	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	1
爪の異常	男	2 (0.0%)	0	0	1	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.0%)	0	0	1	0	0	1	0
皮膚・粘膜の異常	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	1 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
	計	3 (0.0%)	0	0	1	0	1	1	0
ばち状指	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
軽度の腰痛症状	男	2 (0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
	女	9 (0.1%)	0	0	2	4	3	0	0
	計	11 (0.0%)	0	0	2	6	3	0	0
中等度の腰痛症状	男	2 (0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
	女	2 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
	計	4 (0.0%)	0	0	0	1	3	0	0
後屈制限・後屈時疼痛	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
下肢しびれ・知覚異常	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
その他の所見	男	19 (0.1%)	0	1	2	7	1	7	1
	女	5 (0.0%)	0	0	1	3	0	1	0
	計	24 (0.1%)	0	1	3	10	1	8	1
検診者総数	男	22,235	139	1,585	3,565	6,921	6,197	3,427	401
	女	16,070	70	998	2,517	5,513	4,609	2,091	272
	計	38,305	209	2,583	6,082	12,434	10,806	5,518	673

大腸検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	323 (92.0%)	0	2	34	78	112	80	17
	女	211 (93.0%)	0	5	25	62	71	43	5
	計	534 (92.4%)	0	7	59	140	183	123	22
放置可	男	6 (1.7%)	0	0	0	0	1	4	1
	女	10 (4.4%)	0	0	1	4	2	3	0
	計	16 (2.8%)	0	0	1	4	3	7	1
要経過観察	男	20 (5.7%)	0	0	0	5	6	8	1
	女	6 (2.6%)	0	0	0	3	2	1	0
	計	26 (4.5%)	0	0	0	8	8	9	1
要精密検査	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	2 (0.6%)	0	0	0	0	1	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	1
合計	男	351	0	2	34	83	120	92	20
	女	227	0	5	26	69	75	47	5
	計	578	0	7	60	152	195	139	25

直腸診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
外痔核	男	8 (2.3%)	0	0	0	0	2	5	1
	女	12 (5.3%)	0	0	1	4	3	4	0
	計	20 (3.5%)	0	0	1	4	5	9	1
外痔核の疑い	男	2 (0.6%)	0	0	0	1	0	1	0
	女	1 (0.4%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	3 (0.5%)	0	0	0	2	0	1	0
内痔核	男	4 (1.1%)	0	0	0	1	3	0	0
	女	1 (0.4%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	5 (0.9%)	0	0	0	2	3	0	0
内痔核の疑い	男	1 (0.3%)	0	0	0	1	0	0	0
	女	2 (0.9%)	0	0	0	1	1	0	0
	計	3 (0.5%)	0	0	0	2	1	0	0
痔瘻	男	3 (0.9%)	0	0	0	1	1	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3 (0.5%)	0	0	0	1	1	1	0
痔瘻の疑い	男	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
前立腺肥大	男	4 (1.1%)	0	0	0	0	1	2	1
前立腺肥大の疑い	男	6 (1.7%)	0	0	0	1	2	2	1
直腸ポリープの疑い	男	1 (0.3%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
検診者総数	男	351	0	2	34	83	120	92	20
	女	227	0	5	26	69	75	47	5
	計	578	0	7	60	152	195	139	25

乳房検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	10,351	(80.2%)	3	543	1,672	3,102	2,813	1,796	422
放置可	663	(5.1%)	0	12	119	193	200	110	29
要経過観察	1,293	(10.0%)	0	119	358	472	231	91	22
要精密検査	590	(4.6%)	1	22	97	216	148	84	22
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	6	(0.0%)	0	0	0	4	0	2	0
合計	12,903		4	696	2,246	3,987	3,392	2,083	495

乳房触診所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
慢性乳腺炎の疑い	1	(0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
乳腺症	1	(0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
乳腺症の疑い	247	(2.4%)	0	31	56	103	43	13	1
良性乳腺腫瘍	8	(0.1%)	0	2	1	4	1	0	0
良性乳腺腫瘍の疑い	135	(1.3%)	1	14	36	56	22	4	2
乳腺腫瘍	3	(0.0%)	0	0	0	1	2	0	0
乳腺腫瘍の疑い	49	(0.5%)	0	2	8	18	18	2	1
手術後	42	(0.4%)	0	0	0	11	18	12	1
術創あり	45	(0.4%)	0	0	1	8	22	11	3
その他の所見	19	(0.2%)	0	0	9	3	3	4	0
検診者総数	10,356		4	675	1,865	3,309	2,932	1,378	193

マンモグラフィ所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	9,893	(89.4%)	1	350	1,320	3,219	2,858	1,757	388
カテゴリー2	654	(5.9%)	0	8	91	233	192	107	23
カテゴリー3	507	(4.6%)	0	10	66	188	141	81	21
カテゴリー4	10	(0.1%)	0	0	0	4	4	2	0
カテゴリー5	2	(0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
腫瘍	251	(2.3%)	0	7	30	92	71	43	8
石灰化	607	(5.5%)	0	8	91	215	173	98	22
非対称性	371	(3.4%)	0	3	42	128	120	57	21
構築の乱れ	28	(0.3%)	0	0	1	12	11	4	0
その他の所見	29	(0.3%)	0	0	1	11	9	7	1
検診者総数	11,066		1	368	1,477	3,646	3,195	1,947	432

乳房超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
カテゴリー1	2,053	(66.5%)	2	243	636	514	371	224	63
カテゴリー2	923	(29.9%)	0	92	330	314	121	51	15
カテゴリー3	110	(3.6%)	1	12	34	40	17	5	1
カテゴリー4	2	(0.1%)	0	0	1	0	1	0	0
嚢胞疑い	720	(23.3%)	0	73	227	270	100	41	9
濃縮嚢胞疑い	7	(0.2%)	0	0	4	1	2	0	0
嚢胞内病変疑い	9	(0.3%)	0	0	3	5	1	0	0
充実性病変疑い	49	(1.6%)	0	3	14	18	9	3	2
乳腺内低エコー域	25	(0.8%)	0	2	6	13	2	2	0
乳管拡張 (乳輪の範囲を超えら)	204	(6.6%)	0	23	121	47	6	4	3
線維腺腫の疑い	139	(4.5%)	1	15	44	48	26	3	2
その他の所見	146	(4.7%)	0	13	57	36	23	13	4
検診者総数	3,088		3	347	1,001	868	510	280	79

婦人科判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	10,174	(87.3%)	8	839	1898	2898	2656	1576	299
放置可	627	(5.4%)	1	38	92	154	180	127	35
要経過観察	389	(3.3%)	0	15	58	177	115	20	4
要精密検査	465	(4.0%)	0	69	102	170	85	37	2
要治療	3	(0.0%)	0	0	2	1	0	0	0
治療中	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
合計	11,659		9	961	2,152	3,401	3,036	1,760	340

子宮頸部細胞診

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
NILM (異常なし)	11,288	(96.8%)	9	895	2,067	3,271	2,972	1,735	339
ASC-US	265	(2.3%)	0	41	60	98	50	15	1
ASC-H	41	(0.4%)	0	5	8	15	7	6	0
LSIL	41	(0.4%)	0	17	11	8	4	1	0
HSIL	21	(0.2%)	0	3	6	7	2	3	0
AGC	2	(0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
Adenoca.	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
トリコモナス	7	(0.1%)	0	1	1	3	1	0	1
カンジダ	269	(2.3%)	1	50	93	92	23	8	2
その他の所見	11	(0.1%)	0	0	1	2	3	5	0
検診者総数	11,659		9	961	2,152	3,401	3,036	1,760	340

HPV検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
陰性	116	(91.3%)	0	2	85	15	8	5	1
陽性	11	(8.7%)	0	1	6	3	0	1	0
16型 陰性	123	(96.9%)	0	2	89	17	8	6	1
16型 陽性	4	(3.1%)	0	1	2	1	0	0	0
18型 陰性	126	(99.2%)	0	3	90	18	8	6	1
18型 陽性	1	(0.8%)	0	0	1	0	0	0	0
その他の ハイリスク型陰性	119	(93.7%)	0	2	87	16	8	5	1
その他の ハイリスク型陽性	8	(6.3%)	0	1	4	2	0	1	0
検診者総数	127		0	3	91	18	8	6	1

婦人科診察所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
外陰異常	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
外陰異常疑い	2	(0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
外陰炎	2	(0.0%)	0	0	0	0	2	0	0
膣炎疑い	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
萎縮性膣炎	9	(0.1%)	0	0	0	0	2	7	0
カンジダ	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
カンジダ疑い	3	(0.0%)	0	1	0	1	1	0	0
バルトリン腺異常	6	(0.1%)	0	0	0	2	3	1	0
バルトリン腺異常疑い	3	(0.0%)	0	0	0	1	2	0	0
子宮膣部びらん	105	(0.9%)	0	6	27	58	13	0	1
子宮膣部びらん疑い	5	(0.0%)	0	0	1	4	0	0	0
頸管粘膜ポリープ	98	(0.8%)	0	1	13	44	27	12	1
頸管粘膜ポリープ疑い	24	(0.2%)	0	0	4	7	10	3	0
子宮体部腫瘍	181	(1.6%)	0	1	16	92	65	7	0
子宮体部腫瘍疑い	90	(0.8%)	0	0	15	47	25	3	0
子宮附属器炎	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
良性卵巣腫瘍	3	(0.0%)	0	1	1	1	0	0	0
良性卵巣腫瘍疑い	3	(0.0%)	0	0	0	3	0	0	0
卵巣腫瘍	1	(0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
卵巣腫瘍疑い	3	(0.0%)	0	0	1	2	0	0	0
子宮下垂	12	(0.1%)	0	0	0	0	3	7	2
子宮下垂疑い	2	(0.0%)	0	0	0	2	0	0	0
子宮術後	328	(2.8%)	0	0	5	35	142	111	35
その他の所見	5	(0.0%)	0	0	1	2	1	1	0
検診者総数	11,656		9	960	2,150	3,401	3,036	1,760	340



便潜血判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	19,096	(95.4%)	1	80	2,896	6,291	5,892	3,327	609
	女	13,516	(95.7%)	3	79	1,988	4,690	4,110	2,258	388
	計	32,612	(95.5%)	4	159	4,884	10,981	10,002	5,585	997
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	5	(0.0%)	0	0	0	2	3	0	0
	計	6	(0.0%)	0	0	0	2	4	0	0
要精密検査	男	905	(4.5%)	0	4	96	240	289	222	54
	女	595	(4.2%)	0	8	95	185	165	108	34
	計	1,500	(4.4%)	0	12	191	425	454	330	88
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	16	(0.1%)	0	0	6	5	3	2	0
	女	6	(0.0%)	0	0	2	2	2	0	0
	計	22	(0.1%)	0	0	8	7	5	2	0
合計	男	20,018		1	84	2,998	6,536	6,185	3,551	663
	女	14,122		3	87	2,085	4,879	4,280	2,366	422
	計	34,140		4	171	5,083	11,415	10,465	5,917	1085

便潜血の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
便潜血 (一日法)	男	437	12	2.7	2	0	—	59	0	0.0	137	4	2.9	121	5	4.1	94	2	2.1	24	1	4.2
	女	528	19	3.6	1	0	—	77	2	2.6	144	8	5.6	158	5	3.2	134	4	3.0	14	0	—
	計	965	31	3.2	3	0	—	136	2	1.5	281	12	4.3	279	10	3.6	228	6	2.6	38	1	2.6
便潜血 (二日法)	男	19,581	910	4.6	83	4	4.8	2,939	102	3.5	6,399	241	3.8	6,064	288	4.7	3,457	222	6.4	639	53	8.3
	女	13,595	587	4.3	89	8	9.0	2,008	95	4.7	4,736	181	3.8	4,122	165	4.0	2,232	104	4.7	408	34	8.3
	計	33,176	1,497	4.5	172	12	7.0	4,947	197	4.0	11,135	422	3.8	10,186	453	4.4	5,689	326	5.7	1,047	87	8.3

陽性率%

脂質検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
異常なし	男	10,364	(36.8%)	202	2,041	2,412	2,360	1,904	1,257	188
	女	11,621	(51.3%)	139	2,168	3,027	3,783	1,771	602	131
	計	21,985	(43.3%)	341	4,209	5,439	6,143	3,675	1,859	319
放置可	男	5,916	(21.0%)	37	623	1,247	1,631	1,418	849	111
	女	4,148	(18.3%)	16	349	621	1,224	1,253	609	76
	計	10,064	(19.8%)	53	972	1,868	2,855	2,671	1,458	187
要経過観察	男	8,180	(29.1%)	48	641	1,634	2,564	2,086	1,092	115
	女	4,335	(19.1%)	15	295	558	1,131	1,524	715	97
	計	12,515	(24.6%)	63	936	2,192	3,695	3,610	1,807	212
要精密検査	男	1,063	(3.8%)	14	118	220	345	241	111	14
	女	992	(4.4%)	8	175	229	220	240	98	22
	計	2,055	(4.0%)	22	293	449	565	481	209	36
要治療	男	394	(1.4%)	0	18	81	152	104	35	4
	女	169	(0.7%)	0	5	16	31	82	31	4
	計	563	(1.1%)	0	23	97	183	186	66	8
治療中	男	2,234	(7.9%)	0	9	85	450	928	662	100
	女	1,402	(6.2%)	0	4	18	116	546	598	120
	計	3,636	(7.2%)	0	13	103	566	1,474	1,260	220
合計	男	28,151		301	3,450	5,679	7,502	6,681	4,006	532
	女	22,667		178	2,996	4,469	6,505	5,416	2,653	450
	計	50,818		479	6,446	10,148	14,007	12,097	6,659	982

脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
総コレステロール mg/dL	男	21,607	199.1	2,123	178.5	4,125	194.8	6,119	203.5	5,591	204.8	3,208	200.7	441	193.0
	女	15,124	201.1	1,695	178.4	2,925	186.5	4,592	196.8	3,825	218.8	1,785	218.7	302	206.3
	計	36,731	199.9	3,818	178.5	7,050	191.4	10,711	200.6	9,416	210.5	4,993	207.1	743	198.4
中性脂肪 mg/dL	男	27,970	117.8	3,670	84.4	5,599	111.2	7,487	128.0	6,680	129.1	4,002	120.7	532	112.0
	女	22,614	76.6	3,143	58.5	4,448	65.5	6,505	73.3	5,416	88.7	2,652	96.0	450	100.6
	計	50,584	99.4	6,813	72.4	10,047	90.9	13,992	102.5	12,096	111.0	6,654	110.9	982	106.8
HDLコレステロール mg/dL	男	28,112	55.7	3,726	55.9	5,670	54.7	7,501	54.9	6,680	56.8	4,003	56.7	532	55.2
	女	22,666	66.8	3,174	65.6	4,469	66.4	6,505	66.8	5,416	68.8	2,652	65.9	450	59.9
	計	50,778	60.7	6,900	60.3	10,139	59.8	14,006	60.5	12,096	62.2	6,655	60.3	982	57.3
LDLコレステロール mg/dL	男	28,093	119.5	3,713	106.6	5,664	118.6	7,501	124.8	6,680	122.7	4,003	118.4	532	111.0
	女	22,659	113.6	3,170	97.3	4,466	102.7	6,505	111.4	5,416	127.4	2,652	127.7	450	117.5
	計	50,752	116.8	6,883	102.3	10,130	111.6	14,006	118.6	12,096	124.8	6,655	122.1	982	114.0

糖尿病判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	21,479	(70.1%)	321	4,082	5,529	5,691	3,758	1,881	217
	女	19,631	(80.5%)	221	3,517	4,580	5,637	3,922	1,559	195
	計	41,110	(74.7%)	542	7,599	10,109	11,328	7,680	3,440	412
放置可	男	5,286	(17.3%)	9	191	621	1,414	1,753	1,139	159
	女	3,458	(14.2%)	1	109	318	892	1,227	734	177
	計	8,744	(15.9%)	10	300	939	2,306	2,980	1,873	336
要経過観察	男	1,611	(5.3%)	3	33	111	332	616	446	70
	女	614	(2.5%)	1	10	31	106	227	205	34
	計	2,225	(4.0%)	4	43	142	438	843	651	104
要精密検査	男	279	(0.9%)	0	8	17	63	102	81	8
	女	90	(0.4%)	1	3	5	12	31	31	7
	計	369	(0.7%)	1	11	22	75	133	112	15
要治療	男	332	(1.1%)	0	4	32	104	97	78	17
	女	76	(0.3%)	1	3	7	22	22	14	7
	計	408	(0.7%)	1	7	39	126	119	92	24
治療中	男	1,639	(5.4%)	2	12	64	246	641	592	82
	女	512	(2.1%)	1	8	20	69	177	192	45
	計	2,151	(3.9%)	3	20	84	315	818	784	127
合計	男	30,626		335	4,330	6,374	7,850	6,967	4,217	553
	女	24,381		226	3,650	4,961	6,738	5,606	2,735	465
	計	55,007		561	7,980	11,335	14,588	12,573	6,952	1,018

糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	性別	総数		29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		男	女	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数		
血糖 mg/dL	男	27,935	97.3	3,637	88.9	5,604	92.2	7,486	96.5	6,678	101.8	3,999	105.2	531	105.6						
	女	22,540	91.5	3,084	86.6	4,439	87.8	6,500	90.5	5,416	94.0	2,651	98.1	450	104.1						
	計	50,475	94.7	6,721	87.8	10,043	90.3	13,986	93.7	12,094	98.3	6,650	102.4	981	104.9						
HbA1c (NGSP) %	男	14,195	5.5	1,611	5.2	2,435	5.3	4,024	5.4	4,144	5.6	1,747	5.8	234	5.9						
	女	9,145	5.4	929	5.2	1,674	5.3	2,961	5.4	2,374	5.6	1,025	5.7	182	5.8						
	計	23,340	5.5	2,540	5.2	4,109	5.3	6,985	5.4	6,518	5.6	2,772	5.7	416	5.8						

糖負荷試験の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
正常型	男	95	(66.9%)	0	0	1	22	47	17	8
	女	67	(87.0%)	0	3	1	21	28	12	2
	計	162	(74.0%)	0	3	2	43	75	29	10
境界型	男	44	(31.0%)	0	0	2	4	22	10	6
	女	10	(13.0%)	0	0	1	1	7	1	0
	計	54	(24.7%)	0	0	3	5	29	11	6
糖尿病型	男	3	(2.1%)	0	0	0	0	0	1	2
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	(1.4%)	0	0	0	0	0	1	2
合計	男	142		0	0	3	26	69	28	16
	女	77		0	3	2	22	35	13	2
	計	219		0	3	5	48	104	41	18

尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率			
尿糖定性	男	31,199	800	2.6	4,871	22	0.5	6,453	74	1.1	7,991	195	2.4	7,063	294	4.2	4,267	199	4.7	554	16	2.9
	女	24,509	171	0.7	3,918	12	0.3	5,000	22	0.4	6,775	46	0.7	5,616	52	0.9	2,735	34	1.2	465	5	1.1
	計	55,708	971	1.7	8,789	34	0.4	11,453	96	0.8	14,766	241	1.6	12,679	346	2.7	7,002	233	3.3	1,019	21	2.1

痛風判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
	男	女								
異常なし	男	19,085	(74.9%)	173	2,039	3,707	5,330	4,694	2,798	344
	女	16,970	(93.9%)	123	1,950	3,432	5,221	4,145	1,824	275
	計	36,055	(82.8%)	296	3,989	7,139	10,551	8,839	4,622	619
放置可	男	1,882	(7.4%)	17	190	394	563	470	223	25
	女	524	(2.9%)	3	37	73	122	164	107	18
	計	2,406	(5.5%)	20	227	467	685	634	330	43
要経過観察	男	2,302	(9.0%)	16	217	527	689	563	265	25
	女	450	(2.5%)	1	31	46	111	173	72	16
	計	2,752	(6.3%)	17	248	573	800	736	337	41
要精密検査	男	650	(2.6%)	2	66	155	235	130	55	7
	女	89	(0.5%)	0	6	12	18	35	16	2
	計	739	(1.7%)	2	72	167	253	165	71	9
要治療	男	45	(0.2%)	0	7	11	18	4	5	0
	女	12	(0.1%)	0	0	1	2	5	2	2
	計	57	(0.1%)	0	7	12	20	9	7	2
治療中	男	1,524	(6.0%)	0	15	90	352	629	378	60
	女	37	(0.2%)	0	0	1	2	16	12	6
	計	1,561	(3.6%)	0	15	91	354	645	390	66
合計	男	25,488		208	2,534	4,884	7,187	6,490	3,724	461
	女	18,082		127	2,024	3,565	5,476	4,538	2,033	319
	計	43,570		335	4,558	8,449	12,663	11,028	5,757	780

尿酸の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
尿酸 mg/dL	男	25,488	6.10	2,742	6.11	4,884	6.20	7,187	6.17	6,490	6.06	3,724	5.90	461	5.80
	女	18,082	4.42	2,151	4.31	3,565	4.21	5,476	4.28	4,538	4.66	2,033	4.74	319	4.73
	計	43,570	5.40	4,893	5.32	8,449	5.36	12,663	5.35	11,028	5.48	5,757	5.49	780	5.36



貧血・血球数判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	男	20,586 (73.6%)	208	2,780	4,364	5,453	4,711	2,760	310
	女	15,939 (71.3%)	140	2,384	3,219	4,147	3,748	2,026	275
	計	36,525 (72.6%)	348	5,164	7,583	9,600	8,459	4,786	585
放置可	男	4,763 (17.0%)	81	483	858	1,375	1,253	636	77
	女	3,663 (16.4%)	23	426	674	1,029	1,053	382	76
	計	8,426 (16.7%)	104	909	1,532	2,404	2,306	1,018	153
要経過観察	男	2,338 (8.4%)	14	131	341	607	646	512	87
	女	1,969 (8.8%)	12	233	463	727	343	132	59
	計	4,307 (8.6%)	26	364	804	1,334	989	644	146
要精密検査	男	163 (0.6%)	0	5	13	30	35	58	22
	女	438 (2.0%)	1	31	122	219	43	8	14
	計	601 (1.2%)	1	36	135	249	78	66	36
要治療	男	33 (0.1%)	0	2	3	2	6	10	10
	女	74 (0.3%)	0	4	17	43	8	0	2
	計	107 (0.2%)	0	6	20	45	14	10	12
治療中	男	74 (0.3%)	0	0	7	15	30	16	6
	女	284 (1.3%)	3	12	41	147	71	7	3
	計	358 (0.7%)	3	12	48	162	101	23	9
合計	男	27,957	303	3,401	5,586	7,482	6,681	3,992	512
	女	22,367	179	3,090	4,536	6,312	5,266	2,555	429
	計	50,324	482	6,491	10,122	13,794	11,947	6,547	941

貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
赤血球数 万/ $\mu$ L	男	28,007 494.7	3,718 514.8	5,602 505.9	7,494 497.3	6,684 486.0	3,998 474.1	511 460.0
	女	22,376 439.6	3,274 445.4	4,541 438.1	6,312 436.5	5,265 443.4	2,555 437.9	429 419.7
	計	50,383 470.2	6,992 482.3	10,143 475.6	13,806 469.5	11,949 467.2	6,553 460.0	940 441.6
ヘモグロビン g/dL	男	28,000 15.26	3,716 15.55	5,602 15.41	7,490 15.32	6,683 15.16	3,998 14.91	511 14.46
	女	22,375 13.00	3,274 13.08	4,541 12.81	6,312 12.74	5,265 13.30	2,555 13.32	428 12.94
	計	50,375 14.26	6,990 14.40	10,143 14.24	13,802 14.14	11,948 14.34	6,553 14.29	939 13.77
ヘマトクリット %	男	27,072 45.13	3,450 45.83	5,390 45.53	7,250 45.32	6,501 44.93	3,970 44.23	511 43.12
	女	21,789 39.39	3,027 39.48	4,402 38.85	6,209 38.77	5,198 40.17	2,525 40.19	428 39.10
	計	48,861 42.57	6,477 42.86	9,792 42.53	13,459 42.30	11,699 42.81	6,495 42.66	939 41.28
MCV fL	男	3,858 91.51	235 88.99	711 90.03	1,172 91.20	1,187 92.36	464 93.14	89 94.29
	女	2,905 89.95	136 89.13	534 88.90	972 89.15	906 90.76	325 91.82	32 93.32
	計	6,763 90.84	371 89.04	1,245 89.54	2,144 90.27	2,093 91.67	789 92.60	121 94.04
MCH pg	男	3,842 30.91	229 30.16	707 30.46	1,168 30.84	1,185 31.18	464 31.31	89 31.63
	女	2,888 29.70	131 29.74	527 29.28	967 29.33	906 30.02	325 30.42	32 30.85
	計	6,730 30.39	360 30.00	1,234 29.96	2,135 30.16	2,091 30.68	789 30.94	121 31.42
MCHC %	男	3,834 33.78	229 33.91	704 33.84	1,164 33.82	1,184 33.76	464 33.61	89 33.54
	女	2,877 32.98	130 33.39	525 32.88	962 32.84	904 33.06	325 33.13	31 33.08
	計	6,711 33.44	359 33.72	1,229 33.43	2,126 33.38	2,088 33.46	789 33.41	120 33.42
血清鉄 $\mu$ g/dL	男	3,685 117.1	361 107.6	588 118.8	1,055 118.7	1,141 119.4	462 113.7	78 115.5
	女	2,355 101.2	98 92.2	430 99.3	786 98.9	788 104.7	220 104.0	33 100.4
	計	6,040 110.9	459 104.3	1,018 110.6	1,841 110.3	1,929 113.4	682 110.5	111 111.0
白血球数 千/ $\mu$ L	男	25,428 6.19	2,808 6.08	4,805 6.25	7,120 6.30	6,478 6.16	3,741 6.05	476 5.98
	女	18,427 5.75	2,243 6.31	3,683 6.02	5,493 5.80	4,550 5.32	2,076 5.43	382 5.91
	計	43,855 6.00	5,051 6.18	8,488 6.15	12,613 6.08	11,028 5.82	5,817 5.83	858 5.95
血小板数 万/ $\mu$ L	男	8,506 24.29	846 24.87	1,513 25.34	2,380 25.12	2,277 23.71	1,250 22.71	240 21.08
	女	6,805 25.43	560 25.80	1,212 25.77	2,038 26.66	1,842 24.93	883 23.80	270 22.51
	計	15,311 24.79	1,406 25.24	2,725 25.53	4,418 25.83	4,119 24.26	2,133 23.16	510 21.84



炎症反応判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	2,920 (89.1%)	5	52	441	849	996	457	120
	女	2,033 (92.4%)	0	35	323	618	596	379	82
	計	4,953 (90.4%)	5	87	764	1,467	1,592	836	202
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	358 (10.9%)	0	3	47	104	114	66	24
	女	168 (7.6%)	0	5	24	50	48	30	11
	計	526 (9.6%)	0	8	71	154	162	96	35
要精密検査	男	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	3,279	5	55	488	953	1,111	523	144
	女	2,201	0	40	347	668	644	409	93
	計	5,480	5	95	835	1,621	1,755	932	237

炎症反応検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CRP	男	3,254	0	—	45	0	—	484	0	—	952	0	—	1,110	0	—	519	0	—	144	0	—
	女	2,170	0	—	28	0	—	340	0	—	662	0	—	642	0	—	405	0	—	93	0	—
	計	5,424	0	—	73	0	—	824	0	—	1,614	0	—	1,752	0	—	924	0	—	237	0	—
血沈	男	9	0	—	0	0	—	1	0	—	1	0	—	5	0	—	1	0	—	1	0	—
	女	4	0	—	0	0	—	2	0	—	0	0	—	2	0	—	0	0	—	0	0	—
	計	13	0	—	0	0	—	3	0	—	1	0	—	7	0	—	1	0	—	1	0	—

陽性率%

腎機能判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	21,838	(71.3%)	340	3,718	5,000	5,514	4,372	2,621	273
	女	15,781	(64.7%)	183	2,885	3,493	4,007	3,368	1,641	204
	計	37,619	(68.4%)	523	6,603	8,493	9,521	7,740	4,262	477
放置可	男	3,944	(12.9%)	4	402	768	1,159	1,078	466	67
	女	3,443	(14.1%)	13	428	726	1,173	728	309	66
	計	7,387	(13.4%)	17	830	1,494	2,332	1,806	775	133
要経過観察	男	4,100	(13.4%)	12	184	514	1,012	1,289	924	165
	女	4,840	(19.9%)	25	296	711	1,498	1,427	730	153
	計	8,940	(16.3%)	37	480	1,225	2,510	2,716	1,654	318
要精密検査	男	427	(1.4%)	2	19	42	103	127	112	22
	女	196	(0.8%)	3	33	23	28	46	33	30
	計	623	(1.1%)	5	52	65	131	173	145	52
要治療	男	6	(0.0%)	0	0	0	0	2	3	1
	女	3	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	2
	計	9	(0.0%)	0	0	0	0	3	3	3
治療中	男	300	(1.0%)	1	1	22	61	99	91	25
	女	114	(0.5%)	2	8	6	32	34	22	10
	計	414	(0.8%)	3	9	28	93	133	113	35
合計	男	30,615		359	4,324	6,346	7,849	6,967	4,217	553
	女	24,377		226	3,650	4,959	6,738	5,604	2,735	465
	計	54,992		585	7,974	11,305	14,587	12,571	6,952	1,018

腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
尿素窒素 mg/dL	23,598	15,932	2,487	1,793	4,463	3,048	6,670	4,868	6,044	4,048	3,494	1,819	440	356
	13.98	12.45	13.07	11.06	13.29	11.26	13.47	11.74	14.41	13.49	15.33	14.49	17.23	17.03
	39,530	13.36	4,280	12.23	7,511	12.47	11,538	12.74	10,092	14.04	5,313	15.04	796	17.14
クレアチニン mg/dL	24,848	17,281	2,576	1,910	4,671	3,377	7,050	5,295	6,416	4,377	3,660	1,945	475	377
	0.91	0.66	0.88	0.64	0.88	0.63	0.90	0.66	0.92	0.68	0.93	0.68	0.99	0.72
	42,129	0.81	4,486	0.78	8,048	0.78	12,345	0.79	10,793	0.82	5,605	0.84	852	0.87

尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	31,435	1,516	4.8	4,917	133	2.7	6,520	203	3.1	8,048	383	4.8	7,097	432	6.1	4,299	306	7.1	554	59	10.6
	女	24,578	817	3.3	3,935	190	4.8	5,019	155	3.1	6,799	214	3.1	5,618	137	2.4	2,742	81	3.0	465	40	8.6
	計	56,013	2,333	4.2	8,852	323	3.6	11,539	358	3.1	14,847	597	4.0	12,715	569	4.5	7,041	387	5.5	1,019	99	9.7
尿潜血	男	25,551	1,710	6.7	2,919	64	2.2	4,847	228	4.7	7,135	424	5.9	6,459	549	8.5	3,726	396	10.6	465	49	10.5
	女	18,266	4,314	23.6	2,302	455	19.8	3,689	792	21.5	5,406	1,433	26.5	4,464	1,030	23.1	2,034	511	25.1	371	93	25.1
	計	43,817	6,024	13.7	5,221	519	9.9	8,536	1,020	11.9	12,541	1,857	14.8	10,923	1,579	14.5	5,760	907	15.7	836	142	17.0

(+) 以上の人を陽性として判定している

陽性率%

膵機能判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	13,008 (91.2%)	94	1,664	2,564	3,579	3,577	1,365	165
	女	7,217 (90.4%)	18	1,078	1,526	2,139	1,633	697	126
	計	20,225 (90.9%)	112	2,742	4,090	5,718	5,210	2,062	291
放置可	男	416 (2.9%)	0	43	80	145	116	30	2
	女	135 (1.7%)	0	16	27	48	32	12	0
	計	551 (2.5%)	0	59	107	193	148	42	2
要経過観察	男	806 (5.7%)	3	73	96	172	260	163	39
	女	602 (7.5%)	6	70	108	144	166	82	26
	計	1,408 (6.3%)	9	143	204	316	426	245	65
要精密検査	男	27 (0.2%)	0	2	3	3	13	5	1
	女	26 (0.3%)	0	0	5	4	11	4	2
	計	53 (0.2%)	0	2	8	7	24	9	3
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	7 (0.0%)	0	0	0	0	5	2	0
	女	3 (0.0%)	0	0	0	1	0	2	0
	計	10 (0.0%)	0	0	0	1	5	4	0
合計	男	14,264	97	1,782	2,743	3,899	3,971	1,565	207
	女	7,983	24	1,164	1,666	2,336	1,842	797	154
	計	22,247	121	2,946	4,409	6,235	5,813	2,362	361

膵機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
血清アミラーゼ IU/L	男	14,264	74.3	1,879	72.5	2,743	71.3	3,899	71.7	3,971	75.6	1,565	82.3	207	91.8
	女	7,983	79.2	1,188	78.7	1,666	78.7	2,336	76.5	1,842	80.8	797	83.8	154	86.3
	計	22,247	76.0	3,067	74.9	4,409	74.1	6,235	73.5	5,813	77.3	2,362	82.8	361	89.5

電解質判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	1,980 (88.8%)	75	47	257	577	595	324	105
	女	1,123 (82.6%)	33	11	170	336	282	202	89
	計	3,103 (86.5%)	108	58	427	913	877	526	194
放置可	男	180 (8.1%)	0	8	21	48	66	31	6
	女	175 (12.9%)	0	0	23	45	56	33	18
	計	355 (9.9%)	0	8	44	93	122	64	24
要経過観察	男	65 (2.9%)	4	3	3	14	24	13	4
	女	59 (4.3%)	0	1	10	9	16	9	14
	計	124 (3.5%)	4	4	13	23	40	22	18
要精密検査	男	4 (0.2%)	0	0	0	2	0	1	1
	女	2 (0.1%)	0	0	0	0	1	0	1
	計	6 (0.2%)	0	0	0	2	1	1	2
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	2,229	79	58	281	641	685	369	116
	女	1,359	33	12	203	390	355	244	122
	計	3,588	112	70	484	1,031	1,040	613	238

電解質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
ナトリウム mEq/L	男	2,229	140.7	137	140.4	281	140.7	641	140.9	685	140.8	369	140.5	116	139.8
	女	1,358	140.1	45	139.6	203	139.2	390	139.4	354	141.0	244	141.0	122	139.0
	計	3,587	140.5	182	140.2	484	140.1	1,031	140.3	1,039	140.9	613	140.7	238	139.4
カリウム mEq/L	男	2,229	4.14	137	4.16	281	4.08	641	4.10	685	4.13	369	4.20	116	4.25
	女	1,359	4.08	45	4.07	203	4.01	390	4.02	355	4.07	244	4.15	122	4.28
	計	3,588	4.12	182	4.14	484	4.05	1,031	4.07	1,040	4.11	613	4.18	238	4.26
クロール mEq/L	男	2,229	105.4	137	104.0	281	105.3	641	105.6	685	105.8	369	105.3	116	104.7
	女	1,358	105.6	45	105.0	203	105.7	390	105.7	354	105.9	244	105.7	122	104.4
	計	3,587	105.5	182	104.2	484	105.4	1,031	105.6	1,039	105.8	613	105.5	238	104.5
無機リン mg/dL	男	1,985	3.22	60	3.72	271	3.32	628	3.23	658	3.16	303	3.15	65	3.17
	女	1,100	3.57	12	3.65	202	3.55	379	3.44	333	3.67	151	3.65	23	3.76
	計	3,085	3.34	72	3.70	473	3.42	1,007	3.31	991	3.33	454	3.31	88	3.32
カルシウム mg/dL	男	1,994	9.40	61	9.64	272	9.49	628	9.40	665	9.36	303	9.38	65	9.29
	女	1,106	9.30	12	9.29	202	9.24	379	9.19	335	9.40	155	9.41	23	9.39
	計	3,100	9.36	73	9.58	474	9.38	1,007	9.32	1,000	9.37	458	9.39	88	9.31
マグネシウム mg/dL	男	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	女	1	1.7	0	—	0	—	0	—	1	1.7	0	—	0	—
	計	1	1.7	0	—	0	—	0	—	1	1.7	0	—	0	—

その他の血液検査の判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	4,443	(93.3%)	54	384	693	1,102	1,243	785	182
	女	3,738	(95.2%)	74	474	658	938	895	586	113
	計	8,181	(94.2%)	128	858	1,351	2,040	2,138	1,371	295
放置可	男	79	(1.7%)	14	9	5	12	20	16	3
	女	85	(2.2%)	13	6	13	22	21	7	3
	計	164	(1.9%)	27	15	18	34	41	23	6
要経過観察	男	153	(3.2%)	31	11	35	23	24	24	5
	女	58	(1.5%)	4	3	11	15	8	17	0
	計	211	(2.4%)	35	14	46	38	32	41	5
要精密検査	男	86	(1.8%)	0	0	8	16	34	24	4
	女	40	(1.0%)	0	1	3	13	13	7	3
	計	126	(1.5%)	0	1	11	29	47	31	7
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	1	(0.0%)	0	0	0	0	1	0	0
	女	4	(0.1%)	0	0	1	0	2	1	0
	計	5	(0.1%)	0	0	1	0	3	1	0
合計	男	4,762		99	404	741	1,153	1,322	849	194
	女	3,925		91	484	686	988	939	618	119
	計	8,687		190	888	1,427	2,141	2,261	1,467	313

その他の血液検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			29歳以下			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
CEA	男	1341	58	4.3	5	0	—	96	5	5.2	398	12	3.0	587	25	4.3	220	15	6.8	35	1	2.9
	女	877	12	1.4	4	0	—	104	0	—	300	3	1.0	338	7	2.1	117	2	1.7	14	0	—
	計	2218	70	3.2	9	0	—	200	5	2.5	698	15	2.1	925	32	3.5	337	17	5.0	49	1	2.0
RF	男	2503	120	4.8	370	2	0.5	470	10	2.1	575	21	3.7	561	46	8.2	434	35	8.1	93	6	6.5
	女	2328	113	4.9	528	13	2.5	528	21	4.0	574	33	5.7	433	29	6.7	229	13	5.7	36	4	11.1
	計	4831	233	4.8	898	15	1.7	998	31	3.1	1149	54	4.7	994	75	7.5	663	48	7.2	129	10	7.8
CPK	男	158	70	44.3	126	63	50.0	15	5	33.3	10	2	20.0	6	0	—	1	0	—	0	—	—
	女	36	15	41.7	33	14	42.4	0	—	—	2	1	50.0	0	—	—	1	0	—	0	—	—
	計	194	85	43.8	159	77	48.4	15	5	33.3	12	3	25.0	6	0	—	2	0	—	0	—	—
CA199	男	919	3	0.3	4	0	—	55	0	0.0	253	0	0.0	314	1	0.3	256	1	0.4	37	1	2.7
	女	519	10	1.9	3	0	—	48	1	2.1	156	1	0.6	171	3	1.8	123	4	3.3	18	1	5.6
	計	1438	13	0.9	7	0	—	103	1	1.0	409	1	0.2	485	4	0.8	379	5	1.3	55	2	3.6
CA125	男	0	—	—	0	0	—	0	—	—	0	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—
	女	540	15	2.8	17	0	—	72	2	2.8	171	6	3.5	160	4	2.5	105	2	1.9	15	1	6.7
	計	540	15	2.8	17	0	—	72	2	2.8	171	6	3.5	160	4	2.5	105	2	1.9	15	1	6.7
インフラ	男	290	7	2.4	0	—	—	17	2	11.8	82	0	—	93	3	3.2	83	2	2.4	15	0	—
	女	100	2	2.0	0	—	—	3	0	0.0	33	0	—	29	1	3.4	32	1	3.1	3	0	—
	計	390	9	2.3	0	—	—	20	2	10.0	115	0	—	122	4	3.3	115	3	2.6	18	0	—
ProgPRP	男	291	7	2.4	0	—	—	17	0	—	83	0	—	93	1	1.1	83	4	4.8	15	2	13.3
	女	104	0	—	0	—	—	3	0	—	34	0	—	29	0	—	35	0	—	3	0	—
	計	395	7	1.8	0	—	—	20	0	—	117	0	—	122	1	0.8	118	4	3.4	18	2	11.1
NTIProBNP	男	178	12	6.7	1	0	—	9	0	—	42	1	2.4	56	2	3.6	62	8	12.9	8	1	12.5
	女	128	11	8.6	0	—	—	9	0	—	33	2	6.1	42	1	2.4	40	7	17.5	4	1	25.0
	計	306	23	7.5	1	0	—	18	0	—	75	3	4.0	98	3	3.1	102	15	14.7	12	2	16.7

前立腺検査の判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
異常なし	4,658	(94.7%)	0	3	69	373	2,797	1,242	174
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要経過観察	15	(0.3%)	0	0	0	1	4	10	0
要精密検査	135	(2.7%)	0	0	0	2	60	60	13
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	113	(2.3%)	0	0	0	1	43	51	18
合計	4,921		0	3	69	377	2,904	1,363	205

P S A の年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
PSA ng/mL	4,922	1.34	3	1.00	69	0.96	378	0.96	2,904	1.26	1,363	1.57	205	1.88

骨密度検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
異常なし	男	81	(46.8%)	0	0	6	12	22	33	8
	女	621	(46.9%)	32	5	94	214	213	61	2
	計	702	(46.9%)	32	5	100	226	235	94	10
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	46	(3.5%)	1	4	25	16	0	0	0
	計	46	(3.1%)	1	4	25	16	0	0	0
要経過観察	男	67	(38.7%)	0	0	5	9	24	19	10
	女	506	(38.2%)	0	3	43	109	210	124	17
	計	573	(38.3%)	0	3	48	118	234	143	27
要精密検査	男	20	(11.6%)	0	0	0	2	3	8	7
	女	118	(8.9%)	0	0	3	14	52	35	14
	計	138	(9.2%)	0	0	3	16	55	43	21
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	5	(2.9%)	0	0	0	0	1	4	0
	女	34	(2.6%)	0	0	1	3	13	14	3
	計	39	(2.6%)	0	0	1	3	14	18	3
合計	男	173		0	0	11	23	50	64	25
	女	1,325		33	12	166	356	488	234	36
	計	1,498		33	12	177	379	538	298	61

超音波骨密度検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
骨密度 スティフネス	男	173	90.2	0	—	11	95.9	23	91.0	50	91.9	64	89.6	25	84.9
	女	1,325	84.3	45	115.5	166	92.3	356	88.5	488	81.3	234	75.1	36	68.7
	計	1,498	85.0	45	115.5	177	92.6	379	88.6	538	82.2	298	78.2	61	75.3



動脈硬化検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	117 (16.9%)	0	1	17	66	31	2	0
	女	127 (23.3%)	0	1	10	61	50	5	0
	計	244 (19.7%)	0	2	27	127	81	7	0
放置可	男	78 (11.3%)	0	0	4	30	35	8	1
	女	99 (18.1%)	0	0	3	33	43	19	1
	計	177 (14.3%)	0	0	7	63	78	27	2
要経過観察	男	456 (66.0%)	0	0	12	91	188	134	31
	女	292 (53.5%)	0	0	1	34	118	119	20
	計	748 (60.5%)	0	0	13	125	306	253	51
要精密検査	男	36 (5.2%)	0	0	0	1	13	13	9
	女	28 (5.1%)	0	0	0	2	3	18	5
	計	64 (5.2%)	0	0	0	3	16	31	14
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	4 (0.6%)	0	0	0	0	0	2	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	4 (0.3%)	0	0	0	0	0	2	2
合計	男	691	0	1	33	188	267	159	43
	女	546	0	1	14	130	214	161	26
	計	1,237	0	2	47	318	481	320	69

頸部動脈超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
頸動脈の内腔狭窄 (50-75%)	男	19 (2.7%)	0	0	0	0	6	8	5
	女	4 (0.7%)	0	0	0	1	1	2	0
	計	23 (1.9%)	0	0	0	1	7	10	5
頸動脈の高度狭窄 (75%以上)	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
総頸動脈内径拡大	男	2 (0.3%)	0	0	0	0	0	2	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.2%)	0	0	0	0	0	2	0
頸動脈描出不良	男	22 (3.2%)	0	0	1	5	11	5	0
	女	7 (1.3%)	0	0	0	2	3	2	0
	計	29 (2.3%)	0	0	1	7	14	7	0
不安定プラーク (III b)	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	2 (0.4%)	0	0	0	1	0	1	0
	計	2 (0.2%)	0	0	0	1	0	1	0
不安定プラーク (IV)	男	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	2 (0.4%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	3 (0.2%)	0	0	0	0	1	1	1
総頸動脈壁肥厚	男	50 (7.2%)	0	0	0	1	21	19	9
	女	16 (2.9%)	0	0	0	0	4	10	2
	計	66 (5.3%)	0	0	0	1	25	29	11
その他の所見	男	7 (1.0%)	0	0	0	0	4	3	0
	女	2 (0.4%)	0	0	0	0	2	0	0
	計	9 (0.7%)	0	0	0	0	6	3	0
検診者総数	男	691	0	1	33	188	267	159	43
	女	546	0	1	14	130	214	161	26
	計	1,237	0	2	47	318	481	320	69

頸部動脈超音波検査の計測値の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
平均IMT 右 mm	男	691	0.760	1	0.690	33	0.610	188	0.650	267	0.760	159	0.860	43	0.920
	女	546	0.690	1	0.490	14	0.560	130	0.600	214	0.670	161	0.780	26	0.820
	計	1,237	0.730	2	0.590	47	0.600	318	0.630	481	0.720	320	0.820	69	0.880
平均IMT 左 mm	男	691	0.800	1	0.630	33	0.650	188	0.690	267	0.820	159	0.880	43	1.040
	女	546	0.720	1	0.520	14	0.570	130	0.610	214	0.710	161	0.810	26	0.880
	計	1,237	0.770	2	0.580	47	0.630	318	0.660	481	0.770	320	0.850	69	0.980
最大IMT 右 mm	男	691	1.450	1	0.870	33	1.020	188	1.160	267	1.440	159	1.720	43	2.130
	女	546	1.250	1	0.750	14	0.940	130	1.080	214	1.220	161	1.380	26	1.640
	計	1,237	1.360	2	0.810	47	0.990	318	1.120	481	1.340	320	1.550	69	1.950
最大IMT 左 mm	男	691	1.490	1	0.820	33	1.040	188	1.220	267	1.480	159	1.780	43	2.050
	女	546	1.290	1	0.750	14	0.990	130	1.090	214	1.280	161	1.470	26	1.600
	計	1,237	1.400	2	0.790	47	1.020	318	1.170	481	1.390	320	1.620	69	1.880

血圧脈波検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	
ABI検査 右	男	687	1.150	1	1.1	33	1.130	188	1.140	265	1.160	158	1.160	42	1.140
	女	541	1.120	1	1.1	14	1.060	130	1.110	214	1.120	157	1.140	25	1.120
	計	1,228	1.140	2	1.1	47	1.110	318	1.130	479	1.140	315	1.150	67	1.130
ABI検査 左	男	687	1.140	1	1.1	33	1.120	188	1.130	265	1.150	158	1.150	42	1.110
	女	541	1.120	1	1.0	14	1.080	130	1.110	214	1.110	157	1.130	25	1.110
	計	1,228	1.130	2	1.1	47	1.110	318	1.120	479	1.130	315	1.140	67	1.110
PWV検査 右 cm/s	男	687	1412.0	1	1269.0	33	1281.4	188	1279.6	265	1410.7	158	1525.3	42	1692.5
	女	541	1332.2	1	1080.0	14	1101.1	130	1162.1	214	1275.9	157	1515.8	25	1686.1
	計	1,228	1376.9	2	1174.5	47	1227.7	318	1231.6	479	1350.5	315	1520.6	67	1690.1
PWV検査 左 cm/s	男	687	1405.6	1	1282.0	33	1273.4	188	1269.0	265	1405.1	158	1548.3	42	1590.3
	女	541	1349.6	1	1105.0	14	1114.1	130	1180.2	214	1293.4	157	1534.3	25	1692.8
	計	1,228	1380.9	2	1193.5	47	1226.0	318	1232.7	479	1355.2	315	1541.3	67	1628.6

甲状腺検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	92 (45.5%)	0	1	7	21	47	12	4
	女	112 (35.1%)	0	4	21	36	41	10	0
	計	204 (39.2%)	0	5	28	57	88	22	4
放置可	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
要経過観察	男	77 (38.1%)	0	0	5	10	29	24	9
	女	135 (42.3%)	0	1	15	50	35	29	5
	計	212 (40.7%)	0	1	20	60	64	53	14
要精密検査	男	33 (16.3%)	0	0	1	4	15	12	1
	女	70 (21.9%)	0	0	4	19	36	9	2
	計	103 (19.8%)	0	0	5	23	51	21	3
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.3%)	0	0	0	1	0	0	0
	計	1 (0.2%)	0	0	0	1	0	0	0
合計	男	202	0	1	13	35	91	48	14
	女	319	0	5	40	106	113	48	7
	計	521	0	6	53	141	204	96	21

甲状腺超音波検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
右葉に甲状腺結節あり	男	79 (44.1%)	0	0	4	7	31	29	8
	女	141 (51.1%)	0	0	10	46	52	28	5
	計	220 (48.4%)	0	0	14	53	83	57	13
左葉に甲状腺結節あり	男	68 (38.0%)	0	0	2	6	24	29	7
	女	138 (50.0%)	0	0	8	44	48	31	7
	計	206 (45.3%)	0	0	10	50	72	60	14
峡部に甲状腺結節あり	男	9 (5.0%)	0	0	0	1	6	1	1
	女	17 (6.2%)	0	0	3	6	4	4	0
	計	26 (5.7%)	0	0	3	7	10	5	1
充実性腫瘍の疑い	男	42 (23.5%)	0	0	1	3	18	18	2
	女	127 (46.0%)	0	0	6	36	50	30	5
	計	169 (37.1%)	0	0	7	39	68	48	7
嚢胞性病変の疑い	男	132 (73.7%)	0	0	5	12	51	48	16
	女	234 (84.8%)	0	0	17	73	81	51	12
	計	366 (80.4%)	0	0	22	85	132	99	28
甲状腺腫大あり	男	2 (1.1%)	0	0	0	0	1	1	0
	女	11 (4.0%)	0	0	1	2	5	3	0
	計	13 (2.9%)	0	0	1	2	6	4	0
その他の所見	男	13 (7.3%)	0	0	0	2	3	7	1
	女	27 (9.8%)	0	0	1	7	15	3	1
	計	40 (8.8%)	0	0	1	9	18	10	2
検診者総数	男	179	0	1	10	27	82	46	13
	女	276	0	4	30	91	99	45	7
	計	455	0	5	40	118	181	91	20

甲状腺機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
TSH μIU/mL	男	67	2.1	0	—	7	2.7	17	1.8	20	1.9	20	2.4	3	1.9
	女	158	2.6	4	1.8	29	2.3	55	1.6	54	3.6	14	3.6	2	1.8
	計	225	2.5	4	1.8	36	2.4	72	1.7	74	3.2	34	2.9	5	1.9
FT3 pg/mL	男	66	3.2	0	—	6	3.5	17	3.3	20	3.2	20	2.9	3	2.6
	女	158	3.0	4	3.0	29	3.3	55	2.9	54	2.9	14	3.0	2	2.8
	計	224	3.0	4	3.0	35	3.3	72	3.0	74	3.0	34	3.0	5	2.7
FT4 ng/dL	男	66	1.3	0	—	6	1.4	17	1.3	20	1.3	20	1.2	3	1.1
	女	158	1.2	4	1.4	29	1.2	55	1.2	54	1.2	14	1.2	2	1.3
	計	224	1.2	4	1.4	35	1.3	72	1.3	74	1.2	34	1.2	5	1.2

脳検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
異常なし	男	270 (42.5%)	0	1	16	96	112	35	10
	女	186 (42.4%)	0	2	18	40	69	46	11
	計	456 (42.4%)	0	3	34	136	181	81	21
放置可	男	258 (40.6%)	0	0	8	43	113	67	27
	女	183 (41.7%)	0	0	1	35	60	60	27
	計	441 (41.0%)	0	0	9	78	173	127	54
要経過観察	男	52 (8.2%)	0	0	1	5	18	17	11
	女	31 (7.1%)	0	0	0	5	11	9	6
	計	83 (7.7%)	0	0	1	10	29	26	17
要精密検査	男	52 (8.2%)	0	0	2	13	16	16	5
	女	38 (8.7%)	0	1	2	9	10	14	2
	計	90 (8.4%)	0	1	4	22	26	30	7
要治療	男	2 (0.3%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.2%)	0	0	0	1	1	0	0
治療中	男	2 (0.3%)	0	0	1	1	0	0	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	3 (0.3%)	0	0	1	1	0	1	0
合計	男	636	0	1	28	159	260	135	53
	女	439	0	3	21	89	150	130	46
	計	1,075	0	4	49	248	410	265	99

頭頸部MRI検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
無症候性脳梗塞巣	男	22 (3.5%)	0	0	0	2	4	8	8
	女	25 (5.7%)	0	0	0	2	8	10	5
	計	47 (4.4%)	0	0	0	4	12	18	13
脳内異常陰影	男	6 (0.9%)	0	0	0	1	1	4	0
	女	8 (1.8%)	0	0	1	0	4	2	1
	計	14 (1.3%)	0	0	1	1	5	6	1
中耳炎症所見	男	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	2 (0.5%)	0	0	0	1	0	0	1
	計	3 (0.3%)	0	0	0	1	0	1	1
副鼻腔炎	男	58 (9.1%)	0	0	3	12	31	9	3
	女	28 (6.4%)	0	0	0	8	9	10	1
	計	86 (8.0%)	0	0	3	20	40	19	4
くも膜嚢胞	男	12 (1.9%)	0	0	0	5	4	2	1
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	13 (1.2%)	0	0	0	5	5	2	1
その他の所見	男	18 (2.8%)	0	0	1	2	8	3	4
	女	10 (2.3%)	0	0	1	1	5	3	0
	計	28 (2.6%)	0	0	2	3	13	6	4
検診者総数	男	636	0	1	28	159	260	135	53
	女	439	0	3	21	89	150	130	46
	計	1,075	0	4	49	248	410	265	99

頭頸部MRA検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
脳動脈硬化	男	8 (1.3%)	0	0	0	0	2	1	5
	女	5 (1.1%)	0	0	0	0	0	1	4
	計	13 (1.2%)	0	0	0	0	2	2	9
脳動脈瘤	男	31 (4.9%)	0	0	0	9	10	7	5
	女	21 (4.8%)	0	1	1	6	4	8	1
	計	52 (4.8%)	0	1	1	15	14	15	6
内頸動脈狭窄	男	3 (0.5%)	0	0	0	1	0	1	1
	女	3 (0.7%)	0	0	0	0	1	1	1
	計	6 (0.6%)	0	0	0	1	1	2	2
脳動脈狭窄	男	5 (0.8%)	0	0	0	1	2	1	1
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
	計	6 (0.6%)	0	0	0	1	3	1	1
内頸動脈蛇行	男	6 (0.9%)	0	0	0	0	1	2	3
	女	2 (0.5%)	0	0	0	0	0	2	0
	計	8 (0.7%)	0	0	0	0	1	4	3
脳底動脈蛇行	男	2 (0.3%)	0	0	0	1	1	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	2 (0.2%)	0	0	0	1	1	0	0
遺残性三叉動脈	男	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	1 (0.2%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	1 (0.1%)	0	0	0	0	0	1	0
その他の所見	男	3 (0.5%)	0	0	0	1	1	0	1
	女	2 (0.5%)	0	0	0	0	1	1	0
	計	5 (0.5%)	0	0	0	1	2	1	1
検診者総数	男	636	0	1	28	159	260	135	53
	女	439	0	3	21	89	150	130	46
	計	1,075	0	4	49	248	410	265	99

大脳高次機能検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
前頭葉機能低下	男	1 (0.8%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	1 (0.6%)	0	0	0	0	0	1	0
	計	2 (0.7%)	0	0	0	0	0	2	0
MMSE (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	4 (3.2%)	0	0	0	0	0	2	2
	女	1 (0.6%)	0	0	0	0	0	0	1
	計	5 (1.8%)	0	0	0	0	0	2	3
HDS-R (脳の認知機能評価の簡易検査) 低下	男	1 (0.8%)	0	0	0	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	1	0
計算力の低下	男	1 (0.8%)	0	0	0	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	0	0	0	0	1
検診者総数	男	124	0	0	4	6	14	63	37
	女	158	0	0	1	9	19	88	41
	計	282	0	0	5	15	33	151	78

心理検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女							
抑うつ状態	男	23 (18.5%)	0	0	3	3	4	8	5
	女	33 (20.9%)	0	0	0	3	5	17	8
	計	56 (19.9%)	0	0	3	6	9	25	13
検診者総数	男	124	0	0	4	6	14	63	37
	女	158	0	0	1	9	19	88	41
	計	282	0	0	5	15	33	151	78

肥満やせ判定結果

判定	総数			19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	男	女	計							
異常なし	男	16,884	(55.2%)	253	2,979	3,812	4,039	3,405	2,121	275
	女	15,372	(63.4%)	156	2,429	3,160	4,248	3,435	1,732	212
	計	32,256	(58.8%)	409	5,408	6,972	8,287	6,840	3,853	487
放置可	男	1,158	(3.8%)	28	296	291	227	167	126	23
	女	4,451	(18.4%)	35	866	1,109	1,139	952	320	30
	計	5,609	(10.2%)	63	1,162	1,400	1,366	1,119	446	53
要経過観察	男	12,528	(41.0%)	62	1,046	2,243	3,583	3,395	1,969	230
	女	4,433	(18.3%)	17	352	697	1,352	1,220	686	109
	計	16,961	(30.9%)	79	1,398	2,940	4,935	4,615	2,655	339
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
合計	男	30,570		343	4,321	6,346	7,849	6,967	4,216	528
	女	24,256		208	3,647	4,966	6,739	5,607	2,738	351
	計	54,826		551	7,968	11,312	14,588	12,574	6,954	879

身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
身長 c m	男	30,877	170.45	4,759	171.55	6,383	171.86	7,945	171.29	6,997	169.88	4,263	167.29	530	164.33
	女	24,361	157.49	3,874	158.38	5,006	158.63	6,773	158.29	5,618	156.95	2,739	154.12	351	151.16
	計	55,238	164.74	8,633	165.64	11,389	166.04	14,718	165.31	12,615	164.12	7,002	162.13	881	159.08
体重 k g	男	31,114	69.41	4,805	67.49	6,453	70.19	7,999	71.56	7,034	69.88	4,293	66.41	530	63.16
	女	24,420	54.45	3,888	52.29	5,022	54.08	6,793	55.64	5,620	55.21	2,746	53.91	351	52.57
	計	55,534	62.83	8,693	60.69	11,475	63.14	14,792	64.25	12,654	63.37	7,039	61.53	881	58.94
BMI (体格指数)	男	30,877	23.87	4,759	22.92	6,383	23.75	7,945	24.37	6,997	24.20	4,263	23.71	530	23.37
	女	24,361	21.95	3,874	20.83	5,006	21.48	6,773	22.20	5,618	22.42	2,739	22.69	351	23.00
	計	55,238	23.02	8,633	21.98	11,389	22.75	14,718	23.37	12,615	23.40	7,002	23.31	881	23.22
体脂肪率 %	男	3,839	21.87	267	18.36	650	20.75	1,091	21.95	1,231	22.74	498	22.84	102	22.03
	女	3,178	30.33	340	28.61	655	29.33	976	30.26	888	31.16	281	32.16	38	31.71
	計	7,017	25.70	607	24.10	1,305	25.06	2,067	25.87	2,119	26.27	779	26.21	140	24.66
腹囲 c m	男	25,630	83.85	2,479	79.01	4,638	82.47	7,439	84.63	6,610	85.18	3,991	84.72	473	84.61
	女	19,530	77.82	1,597	71.80	3,196	75.07	6,365	77.53	5,390	79.55	2,651	81.27	331	82.99
	計	45,160	81.24	4,076	76.18	7,834	79.45	13,804	81.36	12,000	82.65	6,642	83.34	804	83.94

特定健診判定結果

判 定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	該当	男	3,410 (15.6%)	1	35	220	899	1,297	870
女		473 (3.1%)	0	2	10	102	196	139	24
計		3,883 (10.5%)	1	37	230	1,001	1,493	1,009	112
予備群該当	男	3,352 (15.4%)	1	78	465	1,139	1,009	589	71
	女	638 (4.2%)	0	6	57	202	229	123	21
	計	3,990 (10.8%)	1	84	522	1,341	1,238	712	92
非該当	男	14,699 (67.4%)	83	1052	2651	4,662	3,813	2,186	252
	女	13,652 (89.1%)	13	533	1883	5087	4108	1816	212
	計	28,351 (76.4%)	96	1585	4534	9,749	7,921	4,002	464
判定不能	男	337 (1.5%)	5	83	72	56	68	29	24
	女	552 (3.6%)	4	164	223	101	43	4	13
	計	889 (2.4%)	9	247	295	157	111	33	37
合計	男	21,798	90	1248	3,408	6,756	6,187	3,674	435
	女	15,315	17	705	2,173	5,492	4,576	2,082	270
	計	37,113	107	1,953	5,581	12,248	10,763	5,756	705

体力測定 of 性年齢別平均値

検査項目		総数		29歳以下		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		男	女	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値
全身反応時間 m秒	男	709	337.2	114	305.2	189	341.6	216	344.0	149	341.0	28	349.8	13	372.9
	女	205	378.0	36	347.6	46	419.1	64	363.3	42	370.5	16	403.7	1	423.0
	計	914	346.4	150	315.3	235	356.8	280	348.4	191	347.5	44	369.4	14	376.5
立位体前屈 c m	男	706	2.83	113	8.76	189	2.30	216	1.43	147	1.28	28	1.26	13	3.43
	女	206	7.34	36	13.04	46	5.49	64	5.39	42	7.52	17	7.65	1	0.00
	計	912	3.85	149	9.79	235	2.92	280	2.34	189	2.67	45	3.67	14	3.19
上体おこし 回	男	688	22.2	112	29.4	186	24.3	208	20.7	141	18.5	28	14.2	13	12.3
	女	204	13.7	35	23.9	46	14.2	64	12.6	42	9.0	16	7.5	1	1.0
	計	892	20.3	147	28.1	232	22.3	272	18.8	183	16.3	44	11.8	14	11.5
閉眼片足立ち 秒	男	629	56.32	38	111.58	185	82.52	216	53.75	149	26.11	28	11.25	13	7.69
	女	173	49.76	3	38.00	46	72.59	64	60.03	42	25.98	17	12.82	1	4.00
	計	802	54.90	41	106.20	231	80.55	280	55.19	191	26.08	45	11.84	14	7.43
最大酸素摂取量 mL/分/kg	男	608	34.60	38	41.46	182	37.13	207	33.87	141	31.68	28	31.34	12	28.85
	女	168	32.46	3	36.17	46	35.68	64	32.57	40	29.77	15	28.59	0	—
	計	776	34.13	41	41.07	228	36.84	271	33.56	181	31.26	43	30.38	12	28.85



VDT健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

特定化学物質管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

騒音・高気圧業務健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

電離放射線健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

有機溶剤健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

じん肺・アスベスト健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

有害光線健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.

深夜業務健診管理区分

Table with 10 columns: 判定, 総数, 19歳以下, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include 異常なし, 要経過観察, 二次検査後要経過観察, 要就労制限, 就労により悪化の可能性あり, 就労以外の原因による異常, 要二次検査, 合計.



精密検査判定者の他医療機関からの回答状況

精査項目	対象者	回答数	回答率	回答結果				
				異常なし	放置可	経過観察	治療中	要治療
聴力検査	1	1	100.0%	0	0	1	0	0
肺機能	24	18	75.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
血圧	978	389	39.8%	1	3	6	4	4
脂質	2,618	1,181	45.1%	5.6%	16.7%	33.3%	22.2%	22.2%
糖尿	777	378	48.6%	21	24	144	18	182
痛風	796	377	47.4%	5.4%	6.2%	37.0%	4.6%	46.8%
肝機能・血清蛋白	4,562	2,502	54.8%	204	203	368	45	361
甲状腺検査	103	83	80.6%	17.3%	17.2%	31.2%	3.8%	30.6%
脾機能	53	38	71.7%	30	16	115	49	161
腎機能	632	359	56.8%	7.9%	4.2%	30.4%	13.0%	42.6%
貧血・血球数	708	332	46.9%	23	25	150	15	164
炎症反応	1	1	100.0%	6.1%	6.6%	39.8%	4.0%	43.5%
電解質	6	3	50.0%	231	369	1,551	174	175
その他	126	70	55.6%	9.2%	14.7%	62.0%	7.0%	7.0%
便潜血	1,500	940	62.7%	2	10	64	0	3
虫卵・細菌検査	1	1	100.0%	2.4%	12.0%	77.1%	0.0%	3.6%
眼底検査	578	420	72.7%	10	11	16	0	0
胸部検査	615	406	66.0%	26.3%	28.9%	42.1%	0.0%	0.0%
心電図	212	127	59.9%	73	39	148	58	37
心臓超音波	2	2	100.0%	20.3%	10.9%	41.2%	16.2%	10.3%
上部消化管	1,415	787	55.6%	21	40	76	13	175
腹部超音波	614	435	70.8%	6.3%	12.0%	22.9%	3.9%	52.7%
内科診察	55	26	47.3%	1	0	0	0	0
乳房検査	590	534	90.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婦人科検査	468	317	67.7%	0	0	0	1	2
前立腺検査	135	89	65.9%	22	11	29	2	3
骨密度	138	82	59.4%	31.4%	15.7%	41.4%	2.9%	4.3%
動脈硬化検査	64	47	73.4%	254	212	211	16	31
脳検査	92	80	87.0%	27.0%	22.6%	22.4%	1.7%	3.3%
睡眠時無呼吸検査	42	28	66.7%	0	0	0	0	1
腹部検査	6	4	66.7%	71	113	153	14	54
V D T検査	64	40	62.5%	16.9%	26.9%	36.4%	3.3%	12.9%
肝炎B検査2	1	1	100.0%	207	79	100	9	9
腹部超音波検査	5	5	100.0%	51.0%	19.5%	24.6%	2.2%	2.2%
有機溶剤フリー	1	1	100.0%	14	39	35	6	30
電離放射線	1	1	100.0%	11.0%	30.7%	27.6%	4.7%	23.6%
深夜・有害業務（一服）	43	8	18.6%	0	0	2	0	0
特定業務（一服）	9	2	22.2%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
有機・肝機能・代謝物	2	2	100.0%	110	270	254	16	117
特化物肝機能	1	1	100.0%	14.0%	34.3%	32.3%	2.0%	14.9%
有機（トル、キシ）	35	9	25.7%	57	127	228	5	11
アスベスト	3	1	33.3%	13.1%	29.2%	52.4%	1.1%	2.5%
特定業務簡易	5	1	20.0%	4	2	6	0	9
特定業務	25	9	36.0%	15.4%	7.7%	23.1%	0.0%	34.6%
深夜・有害業務	13	2	15.4%	163	212	129	8	3
じん肺1	12	3	25.0%	30.5%	39.7%	24.2%	1.5%	0.6%
特化物肝機能尿蛋白	5	1	20.0%	25	28	225	0	15
特化物肝5尿蛋白	1	1	100.0%	7.9%	8.8%	71.0%	0.0%	4.7%
				8	5	62	3	8
				9.0%	5.6%	69.7%	3.4%	9.0%
				23	10	16	1	32
				28.0%	12.2%	19.5%	1.2%	39.0%
				6	4	15	6	15
				12.8%	8.5%	31.9%	12.8%	31.9%
				16	17	40	2	4
				20.0%	21.3%	50.0%	2.5%	5.0%
				0	2	3	0	23
				0.0%	7.1%	10.7%	0.0%	82.1%
				0	1	3	0	0
				0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%
				19	17	3	0	1
				47.5%	42.5%	7.5%	0.0%	2.5%
				0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
				0	0	4	0	0
				0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%
				1	0	0	0	0
				100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				1	0	0	0	0
				100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				2	0	0	2	4
				25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%
				0	0	2	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
				0	2	0	0	0
				0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
				3	5	1	0	0
				33.3%	55.6%	11.1%	0.0%	0.0%
				0	1	0	0	0
				0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				0	1	0	0	0
				0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				1	0	5	1	2
				11.1%	0.0%	55.6%	11.1%	22.2%
				0	1	1	0	0
				0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
				2	1	0	0	0
				66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
				0	0	1	0	0
				0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
				1	0	0	0	0
				100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

市民健診総合判定結果

判定	総数		35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	異常なし	男	232 (2.4%)	9	43	22	66	73
女		798 (5.0%)	85	278	149	173	101	12
計		1,030 (4.0%)	94	321	171	239	174	31
放置可	男	388 (4.0%)	9	43	35	132	144	25
	女	1,405 (8.9%)	84	272	247	549	226	27
	計	1,793 (7.0%)	93	315	282	681	370	52
要経過観察	男	3,086 (32.1%)	23	217	172	983	1,328	363
	女	5,303 (33.5%)	59	308	575	2,234	1,696	431
	計	8,389 (33.0%)	82	525	747	3,217	3,024	794
要精密検査	男	993 (10.3%)	5	84	59	348	368	129
	女	1,345 (8.5%)	21	107	159	585	351	122
	計	2,338 (9.2%)	26	191	218	933	719	251
要治療	男	231 (2.4%)	0	22	25	78	75	31
	女	392 (2.5%)	2	16	36	179	126	33
	計	623 (2.4%)	2	38	61	257	201	64
治療中	男	4,678 (48.7%)	2	41	105	1,306	2,351	873
	女	6,590 (41.6%)	2	43	231	2,309	2,960	1,045
	計	11,268 (44.3%)	4	84	336	3,615	5,311	1,918
合計	男	9,608	48	450	418	2,913	4,339	1,440
	女	15,833	253	1,024	1,397	6,029	5,460	1,670
	計	25,441	301	1,474	1,815	8,942	9,799	3,110

市民健診メタボ判定結果

判定	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	該当	男	1,284 (20.5%)	52	82	648
女		693 (5.9%)	13	40	381	259
計		1,977 (11.0%)	65	122	1,029	761
予備群	男	1,078 (17.2%)	84	77	508	409
	女	604 (5.2%)	31	62	306	205
	計	1,682 (9.4%)	115	139	814	614
非該当	男	3,896 (62.2%)	314	259	1,752	1,571
	女	10,384 (88.8%)	980	1,295	5,338	2,771
	計	14,280 (79.5%)	1,294	1,554	7,090	4,342
判定不能	男	7 (0.1%)	0	0	1	6
	女	7 (0.1%)	0	0	0	7
	計	14 (0.1%)	0	0	1	13
合計	男	6,265	450	418	2,909	2,488
	女	11,688	1,024	1,397	6,025	3,242
	計	17,953	1,474	1,815	8,934	5,730

市民健診肥満判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	5,566	(57.9%)	33	215	193	1,478	2,604	1,043
	女	10,947	(69.1%)	172	713	960	4,152	3,802	1,148
	計	16,513	(64.9%)	205	928	1,153	5,630	6,406	2,191
放置可	男	389	(4.0%)	0	23	19	88	175	84
	女	1,659	(10.5%)	49	164	199	633	433	181
	計	2,048	(8.0%)	49	187	218	721	608	265
要経過観察	男	3,653	(38.0%)	15	212	206	1,347	1,560	313
	女	3,227	(20.4%)	32	147	238	1,244	1,225	341
	計	6,880	(27.0%)	47	359	444	2,591	2,785	654
要精密検査	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
合計	男	9,608		48	450	418	2,913	4,339	1,440
	女	15,833		253	1,024	1,397	6,029	5,460	1,670
	計	25,441		301	1,474	1,815	8,942	9,799	3,110

市民健診身体計測の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
身長 c m	男	9,608	164.23	48	170.61	450	170.25	418	168.60	2,913	166.02	4,339	163.30	1,440	160.04
	女	15,833	152.08	253	157.74	1,024	157.98	1,397	156.02	6,029	153.13	5,460	150.24	1,670	146.52
	計	25,441	156.67	301	159.79	1,474	161.73	1,815	158.92	8,942	157.33	9,799	156.02	3,110	152.78
体重 k g	男	9,608	63.06	48	68.23	450	69.36	418	68.25	2,913	64.84	4,339	62.20	1,440	58.45
	女	15,833	51.44	253	53.29	1,024	53.60	1,397	52.98	6,029	52.08	5,460	50.91	1,670	47.97
	計	25,441	55.83	301	55.68	1,474	58.41	1,815	56.50	8,942	56.24	9,799	55.91	3,110	52.82
BMI (体格指数)	男	9,608	23.34	48	23.43	450	23.90	418	23.99	2,913	23.50	4,339	23.30	1,440	22.79
	女	15,833	22.24	253	21.41	1,024	21.48	1,397	21.77	6,029	22.22	5,460	22.55	1,670	22.33
	計	25,441	22.66	301	21.73	1,474	22.22	1,815	22.28	8,942	22.63	9,799	22.88	3,110	22.55
腹囲 c m	男	6,311	84.14	48	82.79	450	84.13	418	84.90	2,909	84.42	2,486	83.71	0	-
	女	11,935	80.11	253	75.48	1,024	76.27	1,397	78.07	6,025	80.55	3,236	81.77	0	-
	計	18,246	81.51	301	76.64	1,474	78.67	1,815	79.64	8,934	81.81	5,722	82.62	0	-

市民健診血圧判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	男	2,674	(27.8%)	35	310	206	884	1019	220
	女	6,374	(40.3%)	239	872	892	2,634	1,488	249
	計	9,048	(35.6%)	274	1,182	1,098	3,518	2,507	469
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
要経過観察	男	2,734	(28.5%)	11	101	117	881	1,249	375
	女	4,159	(26.3%)	12	116	327	1,679	1,585	440
	計	6,893	(27.1%)	23	217	444	2,560	2,834	815
要精密検査	男	433	(4.5%)	0	11	13	130	193	86
	女	560	(3.5%)	2	12	37	214	212	83
	計	993	(3.9%)	2	23	50	344	405	169
要治療	男	86	(0.9%)	0	5	8	23	35	15
	女	116	(0.7%)	0	1	5	40	56	14
	計	202	(0.8%)	0	6	13	63	91	29
治療中	男	3,681	(38.3%)	2	23	74	995	1,843	744
	女	4,624	(29.2%)	0	23	136	1,462	2,119	884
	計	8,305	(32.6%)	2	46	210	2,457	3,962	1,628
合計	男	9,608		48	450	418	2,913	4,339	1,440
	女	15,833		253	1,024	1,397	6,029	5,460	1,670
	計	25,441		301	1,474	1,815	8,942	9,799	3,110

市民健診安静時血圧の性年齢別平均値

検査項目	総数			35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
安静時血圧・ 最大 mmHg	男	9,608	135.4	48	122.2	450	123.5	418	127.2	2,913	134.1	4,339	136.7	1,440	140.9
	女	15,833	131.1	253	109.5	1,024	114.8	1,397	123.3	6,029	130.2	5,460	135.4	1,670	140.6
	計	25,441	132.8	301	111.5	1,474	117.4	1,815	124.2	8,942	131.5	9,799	136.0	3,110	140.7
安静時血圧・ 最小 mmHg	男	9,608	76.6	48	75.3	450	78.4	418	80.1	2,913	79.5	4,339	75.6	1,440	72.2
	女	15,833	73.2	253	66.5	1,024	70.1	1,397	74.4	6,029	74.5	5,460	72.9	1,670	71.7
	計	25,441	74.5	301	67.9	1,474	72.7	1,815	75.7	8,942	76.1	9,799	74.1	3,110	71.9

市民健診肝機能検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	6,346	(66.2%)	28	246	243	1,824	2,975	1,030
	女	13,181	(83.4%)	232	911	1,157	4,935	4,568	1,378
	計	19,527	(76.9%)	260	1,157	1,400	6,759	7,543	2,408
放置可	男	1,637	(17.1%)	10	83	79	530	723	212
	女	1,426	(9.0%)	8	60	117	602	478	161
	計	3,063	(12.1%)	18	143	196	1,132	1,201	373
要経過観察	男	735	(7.7%)	5	43	42	222	314	109
	女	619	(3.9%)	8	19	53	233	226	80
	計	1,354	(5.3%)	13	62	95	455	540	189
要精密検査	男	701	(7.3%)	5	72	53	286	232	53
	女	400	(2.5%)	5	31	55	177	104	28
	計	1,101	(4.3%)	10	103	108	463	336	81
要治療	男	4	(0.0%)	0	1	0	2	1	0
	女	4	(0.0%)	0	0	0	4	0	0
	計	8	(0.0%)	0	1	0	6	1	0
治療中	男	159	(1.7%)	0	5	1	45	78	30
	女	173	(1.1%)	0	3	15	67	71	17
	計	332	(1.3%)	0	8	16	112	149	47
合計	男	9,582		48	450	418	2,909	4,323	1,434
	女	15,803		253	1,024	1,397	6,018	5,447	1,664
	計	25,385		301	1,474	1,815	8,927	9,770	3,098

市民健診肝機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
GOT IU/L	男	9,582	25.9	48	24.2	450	25.5	418	25.7	2,909	26.0	4,323	25.9	1,434	26.2
	女	15,803	23.9	253	19.3	1,024	20.0	1,397	23.0	6,018	24.1	5,447	24.6	1,664	25.1
	計	25,385	24.7	301	20.1	1,474	21.6	1,815	23.6	8,927	24.7	9,770	25.2	3,098	25.6
GPT IU/L	男	9,582	22.7	48	29.5	450	30.8	418	27.2	2,909	24.3	4,323	21.4	1,434	19.3
	女	15,803	18.9	253	15.6	1,024	16.6	1,397	19.7	6,018	19.9	5,447	18.7	1,664	16.9
	計	25,385	20.3	301	17.8	1,474	20.9	1,815	21.5	8,927	21.3	9,770	19.9	3,098	18.0
γ-GTP IU/L	男	9,582	40.6	48	39.8	450	44.4	418	50.0	2,909	45.4	4,323	38.3	1,434	34.0
	女	15,803	24.5	253	19.4	1,024	22.7	1,397	27.4	6,018	26.1	5,447	23.6	1,664	21.5
	計	25,385	30.6	301	22.6	1,474	29.3	1,815	32.6	8,927	32.4	9,770	30.1	3,098	27.3

市民健診腎機能検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	5,773	(60.1%)	47	420	344	2022	2,387	553
	女	11,064	(69.9%)	242	974	1,241	4,651	3,290	666
	計	16,837	(66.2%)	289	1,394	1,585	6,673	5,677	1,219
放置可	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	10	(0.1%)	3	6	1	0	0	0
	計	10	(0.0%)	3	6	1	0	0	0
要経過観察	男	3,101	(32.3%)	1	22	53	648	1,682	695
	女	4,168	(26.3%)	5	38	133	1,138	2,004	850
	計	7,269	(28.6%)	6	60	186	1,786	3,686	1,545
要精密検査	男	489	(5.1%)	0	7	14	172	151	145
	女	427	(2.7%)	1	4	13	181	102	126
	計	916	(3.6%)	1	11	27	353	253	271
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0	0
治療中	男	242	(2.5%)	0	1	7	71	118	45
	女	163	(1.0%)	2	2	9	59	64	27
	計	405	(1.6%)	2	3	16	130	182	72
合計	男	9,605		48	450	418	2,913	4,338	1,438
	女	15,832		253	1,024	1,397	6,029	5,460	1,669
	計	25,437		301	1,474	1,815	8,942	9,798	3,107

市民健診尿検査の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率
尿蛋白定性	男	9,536	241	2.5	47	0	—	450	6	1.3	416	8	1.9	2,897	61	2.1	4,311	100	2.3	1,415	66	4.7
	女	15,728	106	0.7	253	0	—	1,021	2	0.2	1,393	2	0.1	6,007	30	0.5	5,417	40	0.7	1,637	32	2.0
	計	25,264	347	1.4	300	0	—	1,471	8	0.5	1,809	10	0.6	8,904	91	1.0	9,728	140	1.4	3,052	98	3.2

陽性率%

市民健診腎機能検査の性年齢別平均値

検査項目	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
クレアチニン mg/dL	9,582	15,803	25,385	48	253	301	450	1,024	1,474	418	1,397	1,815	2,909	6,018	8,927	4,323	5,447	9,770	1,434	1,664	3,098
	0.95	0.69	0.79	0.83	0.63	0.66	0.86	0.64	0.71	0.91	0.66	0.72	0.92	0.67	0.75	0.92	0.67	0.75	0.95	0.70	0.88

市民健診脂質検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	3,385	(35.3%)	25	131	110	895	1,549	675
	女	4,311	(27.3%)	164	567	419	1,232	1,355	574
	計	7,696	(30.3%)	189	698	529	2,127	2,904	1,249
放置可	男	2,038	(21.3%)	12	84	91	660	935	256
	女	3,443	(21.8%)	50	222	333	1,328	1,160	350
	計	5,481	(21.6%)	62	306	424	1,988	2,095	606
要経過観察	男	2,608	(27.2%)	10	182	151	868	1,096	301
	女	4,079	(25.8%)	25	162	418	1,836	1,301	337
	計	6,687	(26.3%)	35	344	569	2,704	2,397	638
要精密検査	男	390	(4.1%)	1	28	24	116	172	49
	女	665	(4.2%)	13	55	99	285	172	41
	計	1,055	(4.2%)	14	83	123	401	344	90
要治療	男	72	(0.8%)	0	11	11	27	17	6
	女	261	(1.7%)	1	7	27	130	82	14
	計	333	(1.3%)	1	18	38	157	99	20
治療中	男	1,089	(11.4%)	0	14	31	343	554	147
	女	3,044	(19.3%)	0	11	101	1,207	1,377	348
	計	4,133	(16.3%)	0	25	132	1,550	1,931	495
合計	男	9,582		48	450	418	2,909	4,323	1,434
	女	15,803		253	1,024	1,397	6,018	5,447	1,664
	計	25,385		301	1,474	1,815	8,927	9,770	3,098

市民健診脂質検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
中性脂肪 mg/dL	男	9,582	118.3	48	94.4	450	135.4	418	143.7	2,909	125.3	4,323	114.0	1,434	105.5
	女	15,804	101.0	253	68.1	1,024	78.3	1,397	91.4	6,018	103.0	5,448	105.6	1,664	105.2
	計	25,386	107.5	301	72.3	1,474	95.7	1,815	103.5	8,927	110.3	9,771	109.3	3,098	105.3
HDLコレステロール mg/dL	男	9,582	56.1	48	59.4	450	55.0	418	55.6	2,909	56.8	4,323	56.2	1,434	54.9
	女	15,803	65.9	253	68.0	1,024	68.6	1,397	70.7	6,018	66.8	5,447	64.0	1,664	62.8
	計	25,385	62.2	301	66.6	1,474	64.5	1,815	67.2	8,927	63.6	9,770	60.6	3,098	59.2
LDLコレステロール mg/dL	男	9,582	116.9	48	113.3	450	127.2	418	127.7	2,909	120.7	4,323	114.9	1,434	109.0
	女	15,803	126.2	253	106.4	1,024	112.1	1,397	131.2	6,018	132.1	5,447	124.5	1,664	118.2
	計	25,385	122.7	301	107.5	1,474	116.7	1,815	130.3	8,927	128.4	9,770	120.2	3,098	113.9



市民健診糖尿病検査判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
	男	女	計						
異常なし	男	4,298	(44.7%)	38	324	231	1,202	1,841	662
	女	8,785	(55.5%)	221	889	1,027	2,993	2,704	951
	計	13,083	(51.4%)	259	1,213	1,258	4,195	4,545	1,613
放置可	男	2,649	(27.6%)	9	83	105	874	1,243	335
	女	4,515	(28.5%)	26	110	276	2,061	1,643	399
	計	7,164	(28.2%)	35	193	381	2,935	2,886	734
要経過観察	男	1,050	(10.9%)	1	21	37	333	479	179
	女	1,373	(8.7%)	4	17	60	531	590	171
	計	2,423	(9.5%)	5	38	97	864	1,069	350
要精密検査	男	241	(2.5%)	0	4	7	68	112	50
	女	189	(1.2%)	1	0	6	74	82	26
	計	430	(1.7%)	1	4	13	142	194	76
要治療	男	154	(1.6%)	0	10	12	53	53	26
	女	97	(0.6%)	1	0	4	41	34	17
	計	251	(1.0%)	1	10	16	94	87	43
治療中	男	1,213	(12.6%)	0	8	26	383	610	186
	女	873	(5.5%)	0	8	24	329	407	105
	計	2,086	(8.2%)	0	16	50	712	1,017	291
合計	男	9,605		48	450	418	2,913	4,338	1,438
	女	15,832		253	1,024	1,397	6,029	5,460	1,669
	計	25,437		301	1,474	1,815	8,942	9,798	3,107

市民健診糖尿病検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
血糖 mg/dL	9,582	102.4	48	91.9	450	94.1	418	100.3	2,909	102.1	4,323	102.7	1,434	105.4
	15,803	96.6	253	87.1	1,024	88.5	1,397	92.0	6,018	96.2	5,447	98.8	1,664	100.9
	25,385	98.7	301	87.8	1,474	90.2	1,815	93.9	8,927	98.1	9,770	100.5	3,098	103.0
ヘモグロビンA1c (NGSP) %	6,622	5.69	48	5.23	443	5.42	412	5.56	2,872	5.70	2,665	5.74	182	5.89
	10,386	5.60	248	5.26	564	5.27	782	5.45	5,278	5.61	3,337	5.69	177	5.75
	17,008	5.63	296	5.25	1,007	5.34	1,194	5.49	8,150	5.64	6,002	5.71	359	5.82

HbA1cは選択検査として実施されている

市民健診尿糖の性年齢別陽性率

検査項目	性別	総数			35-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
		受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率	受診者数	陽性者数	陽性率			
尿糖定性	男	9,536	650	6.8	47	1	2.1	450	13	2.9	416	21	5	2,897	181	6.2	4,311	293	6.8	1,415	141	10.0
	女	15,728	404	2.6	253	8	3.2	1,021	23	2.3	1,393	26	1.9	6,007	124	2.1	5,417	137	2.5	1,637	86	5.3
	計	25,264	1,054	4.2	300	9	3	1,471	36	2.4	1,809	47	2.6	8,904	305	3.4	9,728	430	4.4	3,052	227	7.4

陽性率%

市民健診貧血・血球数判定結果

判定	総数			35-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
異常なし	男	96	(67.1%)	2	11	7	39	37
	女	861	(83.1%)	33	110	185	411	122
	計	957	(81.2%)	35	121	192	450	159
放置可	男	8	(5.6%)	1	0	2	3	2
	女	58	(5.6%)	0	10	12	25	11
	計	66	(5.6%)	1	10	14	28	13
要経過観察	男	29	(20.3%)	0	2	4	8	15
	女	72	(6.9%)	2	21	11	26	12
	計	101	(8.6%)	2	23	15	34	27
要精密検査	男	10	(7.0%)	0	0	0	6	4
	女	35	(3.4%)	3	21	5	5	1
	計	45	(3.8%)	3	21	5	11	5
要治療	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	女	10	(1.0%)	0	8	1	1	0
	計	10	(0.8%)	0	8	1	1	0
治療中	男	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	女	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
	計	0	(0.0%)	0	0	0	0	0
合計	男	143		3	13	13	56	58
	女	1,036		38	170	214	468	146
	計	1,179		41	183	227	524	204

市民健診貧血・血球数検査の性年齢別平均値

検査項目	総数		35-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-74歳		
赤血球数 万/μL	男	143	458.8	3	551.7	13	489.6	13	458.2	56	453.9	58	451.8
	女	1,036	434.5	38	431.7	170	432.3	214	445.6	468	433.0	146	426.6
	計	1,179	437.5	41	440.5	183	436.4	227	446.4	524	435.2	204	433.7
ヘモグロビン g/dL	男	143	14.27	3	15.93	13	14.53	13	14.37	56	14.18	58	14.19
	女	1,036	12.91	38	12.47	170	11.94	214	13.26	468	13.06	146	13.15
	計	1,179	13.07	41	12.72	183	12.12	227	13.33	524	13.18	204	13.45
ヘマトクリット %	男	143	42.81	3	47.30	13	43.90	13	42.68	56	42.53	58	42.63
	女	1,036	39.45	38	38.19	170	37.35	214	40.42	468	39.73	146	39.93
	計	1,179	39.86	41	38.86	183	37.82	227	40.55	524	40.03	204	40.70

市民健診心電図判定結果

判定	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女				
異常なし	男	129 (69.0%)	7	12	59	51
	女	79 (77.5%)	2	6	42	29
	計	208 (72.0%)	9	18	101	80
放置可	男	7 (3.7%)	0	0	2	5
	女	2 (2.0%)	0	1	0	1
	計	9 (3.1%)	0	1	2	6
要経過観察	男	38 (20.3%)	0	1	24	13
	女	18 (17.6%)	0	1	10	7
	計	56 (19.4%)	0	2	34	20
要精密検査	男	5 (2.7%)	0	0	3	2
	女	2 (2.0%)	0	0	2	0
	計	7 (2.4%)	0	0	5	2
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0
	女	1 (1.0%)	0	0	0	1
	計	1 (0.3%)	0	0	0	1
治療中	男	8 (4.3%)	0	0	5	3
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	8 (2.8%)	0	0	5	3
合計	男	187	7	13	93	74
	女	102	2	8	54	38
	計	289	9	21	147	112

市民健診安静心電図検査所見

所見	総数				40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	所見	総数				40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳		
	男	女	計	割合						男	女	計	割合						
洞性徐脈	男	2	1	3	(1.1%)	0	0	1	1	左室肥大	男	1	1	2	(0.5%)	0	0	1	0
	女	1	1	2	(1.0%)	0	0	1	0		女	1	1	2	(1.0%)	0	0	0	1
	計	3	2	5	(1.0%)	0	0	2	1		計	2	2	4	(0.7%)	0	0	1	1
洞性不整脈	男	1	0	1	(0.5%)	0	0	0	1	左室肥大大疑い	男	4	3	7	(2.1%)	0	0	2	2
	女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0		女	3	3	6	(2.9%)	0	1	1	1
	計	1	0	1	(0.3%)	0	0	0	1		計	7	6	13	(2.4%)	0	1	3	3
左軸偏位 (-30°以下)	男	3	0	3	(1.6%)	0	0	1	2	ST低下	男	1	0	1	(0.5%)	0	0	1	0
	女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0		女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0
	計	3	0	3	(1.0%)	0	0	1	2		計	1	0	1	(0.3%)	0	0	1	0
第一度房室ブロック	男	8	2	10	(4.3%)	0	0	6	2	異常Q波の疑い	男	2	1	3	(1.1%)	0	0	2	0
	女	2	2	4	(2.0%)	0	0	1	1		女	1	1	2	(1.0%)	0	0	0	1
	計	10	4	14	(3.5%)	0	0	7	3		計	3	2	5	(1.0%)	0	0	2	1
不完全右脚ブロック	男	2	0	2	(1.1%)	0	0	2	0	r波増高不良	男	1	0	1	(0.5%)	0	0	0	1
	女	2	0	2	(2.0%)	0	1	0	1		女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0
	計	4	0	4	(1.4%)	0	1	2	1		計	1	0	1	(0.3%)	0	0	0	1
完全右脚ブロック	男	12	3	15	(6.4%)	0	1	5	6	陰性T波	男	8	6	14	(4.3%)	0	0	5	3
	女	3	3	6	(2.9%)	0	0	2	1		女	6	6	12	(5.9%)	0	0	5	1
	計	15	6	21	(5.2%)	0	1	7	7		計	14	12	26	(4.8%)	0	0	10	4
右室伝導遅延	男	2	0	2	(1.1%)	0	0	2	0	T波平低化	男	1	1	2	(0.5%)	0	0	1	0
	女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0		女	1	1	2	(1.0%)	0	0	1	0
	計	2	0	2	(0.7%)	0	0	2	0		計	2	2	4	(0.7%)	0	0	2	0
上室性期外収縮	男	7	0	7	(3.7%)	0	0	3	4	ST上昇	男	4	2	6	(2.1%)	0	0	3	1
	女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0		女	2	2	4	(2.0%)	0	0	2	0
	計	7	0	7	(2.4%)	0	0	3	4		計	6	4	10	(2.1%)	0	0	5	1
心室性期外収縮	男	2	1	3	(1.1%)	0	0	2	0	QT延長	男	1	3	4	(0.5%)	0	0	1	0
	女	1	1	2	(1.0%)	0	0	0	1		女	3	3	6	(2.9%)	0	0	2	1
	計	3	2	5	(1.0%)	0	0	2	1		計	4	6	10	(1.4%)	0	0	3	1
心房細動	男	2	1	3	(1.1%)	0	0	2	0	その他の所見	男	3	0	3	(1.6%)	0	0	1	2
	女	1	0	1	(1.0%)	0	0	0	1		女	0	0	0	(0.0%)	0	0	0	0
	計	3	1	4	(1.0%)	0	0	2	1		計	3	0	3	(1.0%)	0	0	1	2
										検査者総数	男	187	7	13	93	74			
											女	102	2	8	54	38			
											計	289	9	21	147	112			

市民健診眼底写真判定結果

判定	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女				
異常なし	男	45 (25.6%)	5	6	20	14
	女	24 (27.9%)	1	3	14	6
	計	69 (26.3%)	6	9	34	20
放置可	男	12 (6.8%)	0	1	8	3
	女	8 (9.3%)	0	0	3	5
	計	20 (7.6%)	0	1	11	8
要経過観察	男	84 (47.7%)	2	4	40	38
	女	33 (38.4%)	0	2	17	14
	計	117 (44.7%)	2	6	57	52
要精密検査	男	35 (19.9%)	0	2	20	13
	女	20 (23.3%)	1	1	10	8
	計	55 (21.0%)	1	3	30	21
要治療	男	0 (0.0%)	0	0	0	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	0 (0.0%)	0	0	0	0
治療中	男	0 (0.0%)	0	0	0	0
	女	1 (1.2%)	0	0	1	0
	計	1 (0.4%)	0	0	1	0
合計	男	176	7	13	88	68
	女	86	2	6	45	33
	計	262	9	19	133	101

市民健診眼底検査所見

所見	総数		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳
	男	女				
細動脈狭細化	男	1 (0.6%)	0	0	0	1
	女	1 (1.2%)	0	0	1	0
	計	2 (0.8%)	0	0	1	1
細動脈口径不同	男	2 (1.1%)	1	0	1	0
	女	4 (4.7%)	0	1	2	1
	計	6 (2.3%)	1	1	3	1
網膜白斑	男	17 (9.7%)	0	0	11	6
	女	6 (7.0%)	0	0	2	4
	計	23 (8.8%)	0	0	13	10
眼底出血	男	1 (0.6%)	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	1	0
細動脈反射増強	男	48 (27.3%)	1	2	25	20
	女	19 (22.1%)	0	0	7	12
	計	67 (25.6%)	1	2	32	32
動静脈交叉現象	男	32 (18.2%)	0	2	16	14
	女	13 (15.1%)	0	1	8	4
	計	45 (17.2%)	0	3	24	18
点状出血	男	0 (0.0%)	0	0	0	0
	女	1 (1.2%)	0	0	1	0
	計	1 (0.4%)	0	0	1	0
斑状出血	男	1 (0.6%)	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	1	0
白内障の疑い	男	47 (26.7%)	0	1	24	22
	女	24 (27.9%)	0	1	14	9
	計	71 (27.1%)	0	2	38	31
視神経乳頭異常の疑い	男	3 (1.7%)	0	0	3	0
	女	3 (3.5%)	0	0	1	2
	計	6 (2.3%)	0	0	4	2
網膜有髄神経線維の疑い	男	1 (0.6%)	0	0	0	1
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	0	1
網脈絡膜癒痕巣の疑い	男	1 (0.6%)	0	0	1	0
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	1 (0.4%)	0	0	1	0
瞳孔の開き不十分	男	4 (2.3%)	0	1	1	2
	女	0 (0.0%)	0	0	0	0
	計	4 (1.5%)	0	1	1	2
その他の所見	男	6 (3.4%)	0	1	2	3
	女	4 (4.7%)	1	0	3	0
	計	10 (3.8%)	1	1	5	3
検診者総数	男	176	7	13	88	68
	女	86	2	6	45	33
	計	262	9	19	133	101



市民健診前立腺がん検診判定結果

判定	総数		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
異常なし	4,403	(86.8%)	216	1,413	2,212	562
放置可	0	(0.0%)	0	0	0	0
要経過観察	0	(0.0%)	0	0	0	0
要精密検査	362	(7.1%)	3	103	189	67
要治療	0	(0.0%)	0	0	0	0
治療中	310	(6.1%)	2	52	182	74
合計	5,075		221	1,568	2,583	703

市民健診前立腺がん検診P S Aの年齢別平均値

検査項目	総数		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
P S A ng/mL	5,075	2.09	221	1.08	1,568	1.85	2,583	2.07	703	3.05

長寿スマイルチェック結果

判定	総数		65-69歳	70-79歳	80歳以上
該当	男	6,335 (90.7%)	1924	3524	887
	女	8,141 (87.1%)	3229	4110	802
	計	14,476 (88.6%)	5153	7,634	1689
非該当	男	648 (9.3%)	117	328	203
	女	1,210 (12.9%)	270	593	347
	計	1,858 (11.4%)	387	921	550
合計	男	6,983	2,041	3,852	1,090
	女	9,351	3,499	4,703	1,149
	計	16,334	5,540	8,555	2,239

長寿スマイルチェック基本チェックリスト

項目名称	総数		65-69歳	70-79歳	80歳以上
運動機能	男	312 (4.5%)	32	136	144
	女	765 (8.2%)	144	353	268
	計	1,077 (6.6%)	176	489	412
栄養状態	男	11 (0.2%)	2	7	2
	女	22 (0.2%)	7	7	8
	計	33 (0.2%)	9	14	10
口腔機能	男	435 (6.2%)	95	235	105
	女	622 (6.7%)	148	322	152
	計	1,057 (6.5%)	243	557	257
閉じこもり傾向	男	204 (2.9%)	28	96	80
	女	428 (4.6%)	68	192	168
	計	632 (3.9%)	96	288	248
ものわすれ	男	325 (4.7%)	62	161	102
	女	495 (5.3%)	105	241	149
	計	820 (5.0%)	167	402	251
うつ傾向	男	263 (3.8%)	47	120	96
	女	428 (4.6%)	71	206	151
	計	691 (4.2%)	118	326	247
検診者総数	男	6,983	2,041	3,852	1,090
	女	9,351	3,499	4,703	1,149
	計	16,334	5,540	8,555	2,239



児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

検査項目	性別	総 数		
		受診者数	陽性者数	陽性率
尿 糖	男	21,826	21	0.1%
	女	21,430	25	0.1%
	計	43,256	46	0.1%
尿蛋白	男	21,826	271	1.2%
	女	21,430	194	0.9%
	計	43,256	465	1.1%
尿潜血	男	21,826	183	0.8%
	女	21,430	640	3.0%
	計	43,256	823	1.9%

児童・生徒の心臓検査所見 (経過観察者を除く)

判 定		人 数	
心臓の異常	心 房 中 隔 欠 損	17	0.1%
	心 室 中 隔 欠 損	21	0.1%
	肺 動 脈 狭 窄	9	0.1%
	動 脈 管 開 存	4	0.0%
	フ ァ ロ ー 四 徴	0	0.0%
	先天性心疾患(位置異常)	0	0.0%
	先天性心疾患(その他)	5	0.0%
	大 動 脈 弁 疾 患	5	0.0%
	僧 帽 弁 疾 患	6	0.0%
	三 尖 弁 疾 患	7	0.0%
	心 筋 症	0	0.0%
	虚 血 性 心 疾 患	0	0.0%
	心 臓 手 術 後	75	0.5%
	そ の 他	10	0.1%
計	159	1.0%	
その他の異常	胸 郭 変 形	1	0.0%
	先天性心疾患の自然閉鎖	49	0.3%
	川 崎 病 後	210	1.3%
	高 血 圧	0	0.0%
	そ の 他	12	0.1%
計	272	1.7%	
受 診 者 数 合 計		16,174	

判 定		人 数	
心電図の異常	右 室 肥 大	0	0.0%
	左 室 肥 大	1	0.0%
	心 筋 障 害	4	0.0%
	洞 性 頻 脈	0	0.0%
	洞 性 徐 脈	51	0.3%
	上 室 性 期 外 収 縮	37	0.2%
	心 室 性 期 外 収 縮	49	0.3%
	上室性・心室性期外収縮	0	0.0%
	第 1 度 房 室 ブ ロ ッ ク	29	0.2%
	第 2 度 房 室 ブ ロ ッ ク	4	0.0%
	房 室 解 離	0	0.0%
	完 全 右 脚 ブ ロ ッ ク	21	0.1%
	不 完 全 右 脚 ブ ロ ッ ク	84	0.5%
	へ ミ ブ ロ ッ ク	0	0.0%
	刺 激 発 生 異 常	206	1.3%
	W P W 症 候 群	23	0.1%
	P Q 短 縮 ・ L G L 症 候 群	1	0.0%
Q T 延 長 症 候 群	17	0.1%	
そ の 他	27	0.2%	
計	554	3.4%	
X線検査の異常 右2弓突出		1	0.0%

児童・生徒のすこやか検診(血液検査)結果

	性 別	肥 満	血 清 ・ 脂 質				肝機能	貧 血			白 血 球		血小板
		肥満度	総コレステロール	中性脂肪	HDLコレステロール	動脈硬化指数	G P T	赤血球数	ヘモグロビン	ヘマトクリット	白 血 球 数		血小板数
											4.3未満	15.1以上	
受診者	男	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789
	女	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774
	計	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563
要経過観察者数 (%)	男	159 (8.9)	236 (13.2)	55 (3.1)	92 (5.1)	-	32 (1.8)	6 (0.3)	28 (1.6)	13 (0.7)	-	-	-
	女	121 (6.8)	208 (11.7)	42 (2.4)	88 (5.0)	-	7 (0.4)	7 (0.4)	28 (1.6)	15 (0.8)	-	-	-
	計	280 (7.9)	444 (12.5)	97 (2.7)	180 (5.1)	-	39 (1.1)	13 (0.4)	56 (1.6)	28 (0.8)	-	-	-
要精密検査数 (%)	男	62 (3.5)	45 (2.5)	29 (1.6)	0 (0.0)	22 (1.2)	27 (1.5)	0 (0.0)	1 (0.1)	5 (0.3)	24 (1.3)	4 (0.2)	4 (0.2)
	女	36 (2.0)	34 (1.9)	15 (0.8)	0 (0.0)	29 (1.6)	9 (0.5)	0 (0.0)	6 (0.3)	7 (0.4)	23 (1.3)	4 (0.2)	5 (0.3)
	計	98 (2.8)	79 (2.2)	44 (1.2)	0 (0.0)	51 (1.4)	36 (1.0)	0 (0.0)	7 (0.2)	12 (0.3)	47 (1.3)	8 (0.2)	9 (0.3)